

# 14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012  
São Paulo - SP



## Trabalhos Científicos

**Título:** Transplante De Fígado Em Lactente Com Síndrome De Caroli: Relato De Caso

**Autores:** OTINO DM, ROSA MNP, TAKAHASHI KC, MORI CFA, MASSAROLLO P, NASCIMENTO MFA, SALZEDAS-NETO A, SOLER W, ,

**Resumo:** INTRODUÇÃO: Doença de Caroli é uma rara desordem congênita caracterizada pela dilatação segmentar multifocal dos ductos biliares intra-hepáticos e parece ser resultado de um fator que atua precocemente na embriogênese. Quando associada à fibrose hepática congênita é denominada Síndrome de Caroli. Em 2007, foi responsável por 0.13% dos transplantes realizados nos EUA. Usualmente, as manifestações clínicas ocorrem em adultos jovens sendo incomuns em crianças. OBJETIVO: Relatar o caso de uma criança, portadora de Síndrome de Caroli, que foi submetida a transplante hepático com um ano e quatro meses. METODOLOGIA: Descrição de dados coletados retrospectivamente do prontuário. RESULTADOS: Paciente masculino, negro, natural e procedente de São Paulo, nascido a termo com Apgar 9/10, 3200g e 50 cm. Foi encaminhado para o nosso serviço, com quatro meses de vida, por icterícia e acolia fecal. Realizada ultrassonografia de abdome onde foi visualizada a vesícula biliar e , além de sinais de hepatopatia difusa, observadas formações císticas agrupadas no hilo sem sinal de fluxo ao doppler colorido. A biópsia hepática foi sugestiva de fibrose hepática congênita. A colangiorressonância revelou sinais de hepatopatia crônica associada a múltiplas dilatações císticas das vias biliares, sendo firmado o diagnóstico de Síndrome de Caroli. Com 1 ano e quatro meses, não apresentava ganho pondo-estatural satisfatório, com disfunção hepática moderada, sendo indicado transplante de fígado. Atualmente, 1 ano e 5 meses após o transplante, a criança tem boas condições clínicas, recuperação pondo-estatural e função hepática normal. CONCLUSÕES: O lactente apresentava manifestação clínica importante secundária a Síndrome de Caroli, e o transplante de fígado mostrou-se uma forma eficaz de terapia.