

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Prevalencia De Formas Atipicas De Doença Celiaca

Autores: BONUCCI V, SOARES K, AMORIN C, , , , , , ,

Resumo: PREVALÊNCIA DE FORMAS ATÍPICAS DE DOENÇA CELÍACA EM AMBULATÓRIO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA Amorim, Claudio; Bonucci, Vânia; Soares, Kátia Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará/UFPA Objetivos: Estimar a prevalência de formas atípicas de Doença Celíaca em ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica. Metodologia. Estudo transversal realizado no ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará entre janeiro de 2004 e janeiro de 2012 . A amostra foi constituída de 20 pacientes com doença Celíaca com diagnóstico confirmado pela biópsia do intestino delgado. O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário João de Barros Barreto da UFPA, número 2212/03, sem conflitos de interesse com o trabalho. Para análise dos resultados utilizou-se o programa Bio Estat versão 5.0 versão software. Resultados: A prevalência foi de 15% sendo que 10% apresentaram quadro clínico predominante de constipação intestinal, enquanto 5% apresentaram quadro clínico com predomínio de vômitos. O início dos sintomas predominou aos 12 meses, sendo que a distensão abdominal foi o único sintoma presente em 100% dos casos nas duas formas clínicas. O sintoma de diarreia não foi encontrado nas formas atípicas. O diagnóstico os pacientes com a forma clássica ocorreu entre 18 e 24 meses enquanto que naqueles com a forma atípica o diagnostico se deu ente 30 e 36 meses. Conclusões: As formas atípicas estão presentes em 15% dos casos e são causa de retardo no diagnóstico