

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Tricobezoar Gástrico Em Menina De 9 Anos Com Necessidade De Tratamento Cirúrgico

Autores: MULLER LC, NUNES DLA, CANTALICE NETO AF, WINCK JL, FERREIRA PRS, SEELIG E, , , ,

Resumo: Introdução: Menina de 9 anos de idade foi diagnosticada com tricobezoar gástrico por Endoscopia Digestiva Alta (EDA), sendo retirado por laparotomia exploradora. O tricobezoar é uma concreção de cabelos ou pêlos achados no estômago, observado mais frequentemente em pacientes jovens com distúrbios psicológicos. Descrição do caso: N.O.P., 9 anos, branca, feminina, procurou atendimento médico por dor abdominal difusa e vômitos biliosos iniciados há 10 dias. Relata ingestão de cabelo desde os 3 anos de idade, com acompanhamento psicológico prévio. Exame físico sem alterações, exames laboratoriais normais. Rx abdome agudo com alterações sugestivas de sub-occlusão intestinal baixa do intestino delgado e grande defeito de enchimento arredondado no estômago. Tomografia computadorizada de abdome demonstrou distensão da câmara gástrica, com resíduos alimentares heterogêneos impactados e agrupados em seu interior, que se estendem até a transição jejuno-ileal, de aproximadamente 5,5 cm. Avaliação psiquiátrica diagnosticou transtorno obsessivo compulsivo do tipo tricotilomania. Realizado EDA, que evidenciou grande tricobezoar, em fundo gástrico, não sendo possível retirar endoscopicamente. Procedeu-se com laparotomia exploradora, via gastrotomia anterior ampla, com retirada do tricobezoar, além do achado ocasional de Divertículo de Meckel. Paciente com boa evolução pós-operatória, tendo alta após 7 dias. Sugerido acompanhamento psiquiátrico. Comentários: Os tricobezoares ocorrem mais frequentemente em mulheres abaixo dos 30 anos, principalmente em crianças e adolescentes, localizando-se comumente em estômago. Podem cursar com obstrução intestinal. Sempre que possível, devem ser tratados conservadoramente, com EDA, sendo o tratamento cirúrgico reservado para bezoares volumosos e com complicações. O principal objetivo é a avaliação da tricotilomania e a prevenção da recorrência.