

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Características Clínicas Das Doenças Inflamatórias Intestinais De Crianças E Adolescentes Acompanhadas Em Centro De Referência Brasileiro

Autores: VALOIS CM, SDEPANIAN VL, , , , , , ,

Resumo: OBJETIVOS: Avaliar características clínicas das doenças inflamatórias intestinais de crianças e adolescentes de centro de referência brasileiro. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, transversal, com revisão de prontuário de todos pacientes com doença de Crohn e colite ulcerativa, acompanhados no ambulatório. Analisaram-se características clínicas segundo classificação de Paris para ambas doenças. Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. RESULTADOS: Foram incluídos 130 (87%) pacientes, de um total de 150, com doença de Crohn ou colite ulcerativa, com prontuários completos para o estudo. A proporção dos pacientes com doença de Crohn e colite ulcerativa foi 52% e 48%, respectivamente, sem diferença significativa ($P=1,000$) com respeito ao gênero (masculino=60%). Não houve diferença ($P=0,076$) entre a idade (mediana; p25-p75) daqueles com Crohn (9,6; 6,9-13,7) e colite ulcerativa (9,1; 4,6-12,0). Proporção de pacientes com idade no diagnóstico inferior a 5 anos foi maior nos com colite ulcerativa (30%) do que Crohn (11%), porém sem significância estatística ($P=1,000$). Com relação à extensão da colite ulcerativa, a grande maioria apresentou pancolite nas diferentes faixas etárias: <5anos (74%), 5a10anos (85%), >10anos (72%), sem diferença significativa entre estas proporções ($P=0,238$). Quanto à localização do Crohn, não se observou diferença ($P=0,259$) entre as faixas etárias (<5anos, 5a10anos, >10anos) com predomínio das localizações ileocolônica (37%) e colônica (20%). Observou-se predomínio do fenótipo não-estenosante-não-penetrante (55%) do Crohn, com grande proporção das formas penetrante (27%) e estenosante (15%), sem diferença entre idades ($P=0,238$). CONCLUSÕES: Proporção semelhante de crianças e adolescentes com doença de Crohn e colite ulcerativa, sem predomínio de gênero. Pancolite predomina na colite ulcerativa, e localização ileocolônica na doença de Crohn. A maioria dos pacientes com Crohn tem fenótipo não-estenosante-não-penetrante, destacando-se também a forma penetrante.