

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Colite Inespecífica Com Exuberantes Manifestações Extrarticulares: Relato De Caso

Autores: RIBEIRO HB, LUSTOSA AMP, ROCHA EDM, FEITOSA ARX, MARQUES MS, COELHO FMS, TEIXEIRA MJR, LAFUENTE DMF, SILVA MLMS, BRITO LFR

Resumo: Colite inespecífica com exuberantes manifestações extrarticulares: Relato de Caso
Introdução: A Doença inflamatória intestinal é uma afecção de caráter autoimune que tem baixa prevalência na faixa etária pediátrica, mas que tem grandes repercussões nesse grupo de pacientes por apresentar além de acometimento do trato gastrointestinal, manifestações extraintestinais. É subdividida em Doença de Crohn, Retocolite Ulcerativa Inespecífica e a Colite Inespecífica para os casos indiferenciados.
Descrição do Caso: Paciente masculino 14 anos com diarreia disentérica há 45 dias associada à urgência evacuatória, dor abdominal em cólica por vezes relacionada à ingestão de alimentos gordurosos, febre intermitente e eritema nodoso em membros inferiores. Evoluiu com episclerite em olho direito, poliartrite aditiva em cotovelos, punhos e tornozelos, seguindo-se de lesão aftosa em lábio inferior. Os exames complementares revelaram anemia microcítica, elevação de VHS, PCR e α 1-glicoproteína, além de hipoalbuminemia leve e inversão da relação albumina-globulina e discreto aumento de TTPA. Coprocultura, Parasitológico de fezes, FAN, P-ANCA, ASCA, anticardiolipina, anticoagulante lógico, HLA-B27, Fator Reumatoide, complemento e Endoscopia Digestiva Alta dentro da normalidade. Colonoscopia revelou Retocolite ulcerativa até cólon esquerdo. Biopsia laudada como Colite inespecífica. Após antiparasitário houve introdução de Prednisona 60mg/d e Sulfassalazina 4g/d com boa resposta clínica e laboratorial.
Conclusão: A colite inespecífica apesar de pouco prevalente e corresponder a apenas 10% dos casos, ficou demonstrado neste estudo que a mesma tem relevância clínica e pode fazer parte do diagnóstico diferencial de importantes afecções com manifestações extraintestinais tais quais as demonstradas