

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Importância De Um Programa Assistencial Para O Controle Da Constipação De Crianças E Adolescentes Com Câncer Em Uso De Morfina

Autores: MARMO MCR, CARAN EMM, PUTY F, MORAIS MB, , , , , ,

Resumo: Objetivos: avaliar a efetividade de um programa específico para o controle da constipação secundária ao uso de opióides. Metodologia: Estudo de série de casos, prospectivo, não randomizado, com braço único, realizado no período de fevereiro a novembro de 2007. Todos os pacientes avaliados eram portadores de tumores malignos, com idade entre 4 e 20 anos, obrigatoriamente em tratamento com morfina para o controle de dor. O programa específico para controle da constipação era constituído por orientações, avaliações periódicas do hábito intestinal, prevenção da constipação com início precoce de laxantes e prescrição de desimpactação fecal quando necessário. As avaliações do hábito intestinal foram realizadas através de questionário estruturado, na admissão, após 72 horas e posteriormente ao final da primeira, segunda e terceira semana de acompanhamento. Resultados: Foram admitidos 17 pacientes, sendo que 58,8% (10/17) eram considerados fora de possibilidade de cura. Na admissão, 29,4% (5/17) dos pacientes apresentavam constipação intestinal. Na primeira semana do uso morfina e lactulona, 35,2% (6/17) dos pacientes ficaram constipados. Na segunda e terceira semanas, constipação ocorreu em 28,5% (4/14) e 11,1% (1/9), respectivamente. Conclusões: A constipação intestinal foi freqüente nos pacientes que utilizaram morfina, 35,2%, 28,5% e 11,1%, respectivamente, na primeira, segunda e terceira semanas, apesar do tratamento profilático com laxantes. Entretanto, um protocolo com intervenção e atenção específica à constipação intestinal pode aumentar a adesão dos pacientes aos laxantes e tratar precocemente a impactação fecal.