

# 14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012  
São Paulo - SP



## Trabalhos Científicos

**Título:** Nascimento E Tempo De Aleitamento Materno Associados Ao Desencadeamento Da Doença Celíaca Antes Dos Dois Anos De Vida

**Autores:** ANTUNES M, BRANDT KG, MARMO MC, ANTUNES NS, GOMES FSRC, SILVA JFFA, MOTTA ME, , ,

**Resumo:** Objetivo: Avaliar a associação entre circunstâncias do nascimento e aleitamento materno como desencadeamento da da doença celíaca antes dos dois anos de vida. Métodos: Foram estudadas crianças, menores que cinco anos, com doença celíaca diagnosticada até os dois anos de vida, acompanhadas no ambulatório de gastroenterologia pediátrica do IMIP (casos) e crianças submetidas a procedimento cirúrgico ambulatorial com idade de dois a cinco anos e sorologia negativa para o anticorpo anti-transglutaminase IgA (controles). Em todos os participantes pesquisou-se tipo de parto, peso ao nascimento, prematuridade, internação em unidade neonatal, presença e tempo de aleitamento materno exclusivo por meio de questionário estruturado. As frequências foram descritas em porcentagem com os seus intervalos de confiança de 95% e sua associação testada por qui-quadrado ou Fisher. A diferença entre as idades, pesos ao nascimento e tempo de aleitamento materno foi avaliada pelo teste de Kruskal-Wallis. Considerou-se significativa o  $p < 0,05$ . Resultados: Foram avaliados 38 casos e 92 controles. Não se observou diferença entre a frequência de prematuridade, peso ao nascimento e internamento em UTI neonatal entre os grupos. Houve maior frequência de parto cesáreo ( $p=0,02$ ) dentre os portadores de doença celíaca. Embora se observe uma tendência a menor tempo de aleitamento materno dentre os casos, não houve significância estatística pelos parâmetros considerados ( $p=0,06$ ) Conclusões: Nesse grupo encontrou-se associação entre parto cesáreo com doença celíaca desencadeada antes do segundo ano de vida.