



14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

30 de abril a 3 de maio . 2014

Hotel Summerville | Porto de Galinhas | PE

Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Miliar De Múltiplas Localizações

Autores: RENATA GOUGET FERREIRA SILVANO (HMJ); SOLANGE GONÇALVES DAVID DE MACEDO (HMJ); MARIANA DE OLIVEIRA CHEDID (HMJ); LÍVIA MARIA MAIA NUNES CABRAL (HMJ); BEATRIZ LAM (HMJ); ADRIANA PAIVA MESQUITA (HMJ); LUCIANA ANTUNES CHAGAS (HMJ); SUELLEN DA SILVA SANTOS (HMJ); ROBERTA PINHEIRO DA CUNHA (HMJ)

Resumo: Introdução: Relato de adolescente imunocompetente com tuberculose disseminada. Descrição do caso: PHFS, masculino, 15 anos, febre intermitente, dificuldade de deambulação, edema e úlcera maleolar esquerda. Tratado para osteomielite com 32 dias de oxacilina. Evoluiu sem melhora, mantendo febre, artralgia e perda ponderal de 5 Kg. Radiografia de tórax mostrou infiltrado micronodular difuso, teste tuberculínico reator (11 mm). Negava história epidemiológica para tuberculose, apresentando cicatriz vacinal do BCG. Iniciado esquema quádruplo (RIPE). Posteriormente, lesão maleolar evoluiu com bordo necrótico e saída de grande quantidade de secreção purulenta. Evoluiu com úlcera em região infraesternal com solução de continuidade para os tecidos inferiores e otite média bilateral com supuração a esquerda. Sorologias para HIV, histoplasmose, paracoccidioidomicose e aspergilose negativas. Imunoglobulinas séricas normais. Material para baciloscopia do escarro insuficiente. Tomografia do esterno: destruição do terço distal esternal e bordo superior do apêndice xifóide. TC tórax: múltiplos pequenos nódulos com densidade de partes moles e opacidade centro lobulares com aspecto de árvore em brotamento, em ambos pulmões mais evidente em lobo superior, ausência de linfonomegalias. Biopsia do fragmento ósseo pré-esternal e maleolar demonstra processo granulomatoso inespecífico. Avaliações pelos serviços: pneumologia: tuberculose pulmonar miliar; dermatologia: tuberculose cutânea; ortopedia: tuberculose óssea esternal e maleolar; otorrinolaringologia: aspecto sugestivo de tuberculose de ouvido médio. Paciente em uso de esquema tuberculostático, acompanhamento ambulatorial multidisciplinar e fisioterapia semanal. Apresenta melhora clínica importante, embora ainda necessite de muletas para andar. Comentário: Chama atenção a forma disseminada da tuberculose (4 sítios de localização) em adolescente previamente hígido e imunocompetente.