14º Congresso Brasileiro de
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
II Simpósio Internacional de Terapia Intensiva Cardiológica Pediátrica
Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília . DF . 22 a 25 de junho de 2016

Trabalhos Científicos

Título: Bloqueio Atrioventricular Total Por Lúpus Eritematoso Neonatal

Autores: LARISSA FIGUEIREDO BEZERRA (UNICEUB - DF); JULIA CORRÊA SAVELLI (UNICEUB - DF); CRISTINA DUTRA ROSA (HBDF - SES); ANA AMELIA FIALHO MOREIRA (HBDF - SES); IZAURA COSTA RODRIGUES EMIDIO (HBDF - SES); ANDRÉA LOPES RAMIRES KAIRALA (HBDF - SES/UNICEUB - DF)

Resumo: INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Neonatal (LEN) doença congênita rara, têm como complicação Bloqueio Átrio Ventricular Total (BAVT), podendo estar associado à miocardite, responsável por 31% da mortalidade. Constitui uma das indicações terapêuticas de marcapasso (MP) cardíaco no recém-nascido. A incidência do BAVT é de 1:22.000 casos em nascidos vivos, alta taxa de morbimortalidade. Objetivo desse trabalho é relatar caso de recém-nascido com diagnóstico fetal de BAVT, bem como condutas para o tratamento e prevenção das morbidades associadas.DESCRIÇÃO DE CASO:RN a termo com diagnóstico fetal de BAVT, mãe portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico Ativo e Hipertensão Arterial, em uso de cloroquina e metildopa. Parto cesáreo por bradicardia fetal, sofrimento fetal com líquido meconial. APGAR06/07 P:2700g, Est:48cm e PC:33cm. Evoluiu com apnéia e desconforto respiratório necessitou de ventilação com pressão positiva; FC:60bpm na sala de parto. Entubado e iniciado dobutamina.(FC: 45bpm). Ecocardiograma fetal: BAVT grau II, disfunção sistólica de ambos os ventrículos, insuficiências mitral e tricúspide. Indicado marcapasso cardíaco. Houve complicação infecciosa no sítio de implantação do marcapasso, esse foi exteriorizado e colocado MP definitivo após controle do quadro infeccioso.CONCLUSÕES:O BAVT pode ser detectado entre 16ª e 24ª semana de gestação.Responsável por 31% da mortalidade relacionada ao LEN e, quando associado com bradicardia e hidropsia fetal, apresenta uma mortalidade superior a 80%. O pré-natal é fundamental para o diagnóstico precoce. Os procedimentos de averiguação das condições de saúde do RN, bem como o conhecimento e domínio das técnicas de reanimação neonatal fazem total diferença no prognóstico de enfermidades tais como o BAVT.

http://anais.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/14-congresso-brasileiro-de-terapia-intensiva-peditrica/0008-bloqueio-atrioventricular-total-por-lupus-eritematoso.pdf