



14º Congresso Brasileiro de
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

II Simpósio Internacional de Terapia
Intensiva Cardiológica Pediátrica

Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília . DF . 22 a 25 de junho de 2016



Trabalhos Científicos

Título: Febre De Chikungunya Em Um Neonato Relato De Caso

Autores: MARIA LUIZA BARROS DE MEDEIROS (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); ELI AGUIAR DO NASCIMENTO (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); THALITA MAYARA XAVIER DE OLIVEIRA (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); SABRINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); LOUISE LEIROS FERREIRA SIQUEIRA (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO)

Resumo: INTRODUÇÃO A febre de chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya . Casos de transmissão vertical podem ocorrer, no período de intraparto em gestantes virêmicas . Os sinais e os sintomas são semelhantes aos da dengue. As manifestações cutâneas em crianças diferem do adulto: o exantema maculopapular aparece mais cedo, mas Lesões vesicobolhosos são mais comuns ; acrocianose; equimoses, hemorragias subungueal e trombocitopenia, (raros). Há a possibilidade de ocorrência de epidemias no Brasil devido à alta densidade do vetor, à presença de indivíduos susceptíveis e à intensa circulação de pessoas em áreas endêmicas. DESCRIÇÃO DO CASO A.M.A.F.S 24 DV, Fem, de Natal – RN, cesárea, apgar 9/9, a termo, após 24h de alta hospitalar evoluiu com febre e no 6º DV apresentou irritabilidade, sucção débil, edema bilateral dos pés, lesões crostosas em lábio inferior e úlceras em palato duro. Foi encaminhada a enfermaria desse hospital para internação, onde iniciou ATB, HV, sintomático, dieta e tinha na ocasião um hemograma com SHR 3 e PCR positiva. No 3º dia apresentou apnéia , sendo encaminhada à UTI neonatal, onde permaneceu 3 dias ,mas sem apneias. Alta no 12º DI para acompanhamento ambulatorial. Mãe no 3º trimestre gravidez com quadro de dor articular , mialgia, exantema e no terceiro dia de doença teve o RN. Nosso paciente teve uma evolução benigna. Não há tratamento antiviral específico. A prevenção se baseia no controle vetorial, medidas de proteção individual e uma vacina efetiva e licenciada.