



14º Congresso Brasileiro de
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

II Simpósio Internacional de Terapia
Intensiva Cardiológica Pediátrica

Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília . DF . 22 a 25 de junho de 2016



Trabalhos Científicos

Título: Febre De Chikungunya Em Lactente Relato De Caso

Autores: MARIA LUIZA BARROS DE MEDEIROS (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); ELI AGUIAR DO NASCIMENTO (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); THALITA MAYARA XAVIER DE OLIVEIRA (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); SABRINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO); LOUISE LEIROS FERREIRA SIQUEIRA (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO)

Resumo: INTRODUÇÃO A febre de chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya . Os sinais e os sintomas são semelhantes aos da dengue. As manifestações cutâneas em crianças diferem do adulto: o exantema maculopapular aparece mais cedo, mas Lesões vesicobolhosos são mais comuns, com causas desconhecidas ; pode haver sintomas hemorrágicos, as vezes graves, mas não fatais. DESCRIÇÃO DO CASO E.A.F.O, 1 M e 28DV, Masc, de Currais Novos-RN, internado com relato de picada de inseto há 7 dias em MIE. Há 48h com irritabilidade, exantema e febre ehá 24h com lesões bolhosas em MMII e aumento do rash cutâneo. EGR, choroso, exantema em todo corpo; AP-normal FR 30 ipm; AC 120 bpm; abdome flácido com RHA + e sem visceromegalias; boa perfusão periférica.Recebeu ER + HV +ATB. Com 24h as lesões bolhosas evoluíram para lesões necróticas, agravamento do quadro sendo entubado e iniciado DVA + albumina;quadro também de sangramento , recebendo hemoderivados. Exames hemograma com anemia + leucocitose + plaquetopenia + PCR +; hiponatremia, hipoalbuminemia e outros exames e culturas em andamento. Evoluiu muito grave, e no 5º DI foi a óbito. Enviado para SVO. Mãe apresentando exantema e febre no mesmo período. Embora com relatos na literatura da boa evolução no quadro hemorrágico, o nosso paciente teve evolução fatal. Não há tratamento antiviral específico . A organização dos serviços de saúde é fundamental para promover a assistência a esses pacientes, organizar ações de prevenção e controle da doença.