



14º Congresso Brasileiro de
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

II Simpósio Internacional de Terapia
Intensiva Cardiológica Pediátrica

Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília . DF . 22 a 25 de junho de 2016



Trabalhos Científicos

Título: Saída Não Planejada De Cateter Enteral Em Unidade De Terapia Intensiva Pediátrica

Autores: MARIA LUCIA BARBOSA MAIA DOS SANTOS (ICR- HCFMUSP); ERIKA CRISTINA MAFRA PEREIRA (ICR-HCFMUSP); JULIANA CAIRES DE OLIVEIRA ACHILI FERREIRA (ICR- HCFMUSP); HILDA YOGUI (ICR-HCFMUSP); ANA CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO (ICR-HCFMUSP); MÔNICA TAMINATO (ICR- HCFMUSP); KARINA RODRIGUES PERON (ICR- HCFMUSP)

Resumo: Objetivo: Identificar as principais causas de saída não planejada de sonda enteral. Método: Estudo transversal, retrospectivo, com coleta de dados em prontuário de pacientes hospitalizados entre 2014 à 2015. Resultados: o estudo evidenciou que 65,2% dos pacientes que perderam acidentalmente a sonda gástrica estavam agitados e um terço desses pacientes recebia sedação e estava em ventilação mecânica. Foi relevante o fato de que 64,9% dos eventos ocorreu no plantão noturno, e 78,3% dos pacientes tinha sonda na posição gástrica. Conclusão: Os resultados deste trabalho revelaram a necessidade de pesquisar o porquê da prevalência do evento no período noturno, e permitiram inferir que os pacientes com a sonda na posição gástrica precisam de maior atenção nos cuidados devido ao risco de bronco-aspiração. Desta forma é necessário que o enfermeiro prescreva ações voltadas para monitorização e segurança desses pacientes, incluindo avaliação periódica da dor, utilização de escalas de sedação e analgesia.