



17 a 20 de maio de 2017

Culabá / MT

Trabalhos Científicos

Título: Dermatite Atópica Precoce Em Lactente: Pimecrolimus Como Alternativa Eficaz No Tratamento – Relato De Caso

Autores: HENRIQUE MATTOS MACHADO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA); MARIANA BARROS INNOCENTE (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA); MARINA DA SILVEIRA MEDALHA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA); RAPHAEL COELHO FIGUEIREDO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA); ELAINE ROSA ARRUDA DE PAULA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA); KARLA MACEDO BRANDÃO DE ABREU (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA); LUIZ CLAUDIO PEREIRA FERNANDES (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - SUPREMA)

Resumo: Introdução – A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica de etiologia multifatorial, caracterizada por erupção eczematosa pruriginosa recorrente e xerose cutânea, que geralmente se inicia nos primeiros anos de vida. Descrição do caso - Lactente MSS, 20 dias de vida, sexo masculino, em sua primeira consulta no ambulatório de pediatria devido a presença de lesões difusas em tórax, abdome, dorso, dobras, glúteo e face, lesões estas que iniciaram a partir da segunda semana de vida e com piora progressiva. Sem outros sinais associados como sibilância e sintomas respiratórios. Em aleitamento materno exclusivo, nascido de parto normal, gestação e pré-natal sem intercorrências. HFA positiva para asma (pai e mãe) e dermatite atópica (pai). Conduta inicial: dieta de exclusão materna de ovo, leite de vaca e derivados; orientações quanto ao controle ambiental e cuidados com a pele; uso de hidratante e corticoide tópico; e retorno em 3 semanas. No retorno (lactente com 1mês e 5dias de vida), a mãe refere pouca melhora das lesões, seguindo a dieta, orientações e medicações corretamente. Criança ainda apresentando lesões descamativas difusas, xerodermia e irritabilidade. Então, foi iniciado o uso “off label” do Pimecrolimus 1%, 2x ao dia e nova reavaliação em 2 semanas. Na ultima consulta paciente apresentava-se em excelente estado geral, sem nenhuma lesão na pele. Comentários - Segundo a literatura, o Pimecrolimus é indicado para pacientes acima de 3 meses de idade, como no caso em questão não houve resposta satisfatória com dieta de exclusão materna, corticoide tópico e hidratação cutânea, a decisão de usar a droga “off label” foi agraciada com êxito terapêutico.