



17 a 20 de maio de 2017

Cuiabá / MT

## Trabalhos Científicos

**Título:** Restrição Dietética E Acompanhamento Nutricional

**Autores:** CELSO TAQUES SALDANHA (); RAFAEL PIMENTEL SALDANHA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); MAYSA MILLENA DE MATTOS LUZ (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); AILLYN FERNANDA BIANCHI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); BRENO HENRIQUE LINDOTE (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); VALDEY ANONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); NATHALIA SILVA ARAUJO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); THAÍS PONCIANO SILVA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); ANAMARIA SALLES ANDRADE (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC)

**Resumo:** Introdução: Diante do consumo do leite de vaca pela nutriz, ocorre transferências de frações proteicas bovinas para o leite materno e dessa forma 0,5% dos lactentes sob aleitamento materno e com predisposições genéticas podem ser sensibilizados e apresentarem alergias alimentares. Como a amamentação não pode ser interrompida em decorrência dos inúmeros benefícios do aleitamento materno, preconiza-se, muitas vezes, dietas muito restritivas à nutriz, colocando-a em risco nutricional e impactando dessa forma, sua qualidade de vida. Objetivo: Relato de caso em lactente apresentando alergia ao leite de vaca e necessidade de restrição dietética desse leite e derivados para a nutriz. Relato de caso: Lactente, 6 meses de vida, feminina e ainda sob aleitamento materno exclusivo, começou a apresentar episódios de evacuações diarreicas recorrentes e desacelerações do peso e estatura. IgE específica (método de quimioluminescência) evidenciou: alfa<sup>2</sup>lactoalbumina= 0,23 Ku/l (baixa); beta<sup>2</sup>lactoglobulina= 4,51 ku/l (alta) e caseína= 0,16 Ku/l (baixa). Antiendomísio e antitransglutaminase indetectáveis. Optou-se em suspender o leite de vaca e derivados para a genitora e orientação para procurar serviço nutricional, buscando dessa forma, adequação de seu cardápio. Foi receitado também suplemento de cálcio diariamente. Conclusão: Além da manutenção do aleitamento materno para a criança e sob restrição ao consumo de leite de vaca e seus derivados pela nutriz, o acompanhamento em serviço de nutrição para a genitora foi fundamental, pois sua dieta foi cuidadosamente formulada e adequada às suas necessidades diárias