



17 a 20 de maio de 2017

Cuiabá / MT

Trabalhos Científicos

Título: Anafilaxia Após Uso Soro Antibotrópico: Relato De Um Caso Em Rondônia.

Autores: MIRELA MARTINS BARRETO CUNHA (HICD); LUIZ PIAIA NETO (IPEMED); MAURÍCIO DOMINGUES FERREIRA (IPEMED)

Resumo: Introdução: O soro antibotrópico contém solução injetável da fração F(ab')₂ de imunoglobulinas específicas e purificadas, obtidos de equinos superimunizados com uma mistura de venenos de serpentes do gênero Bothrops. Seu efeito neutraliza o efeito do veneno. Descrição do caso: T.V.A.T, feminino, 9 anos, após acidente ofídico evoluiu com quadro de urticária e desconforto respiratório durante a administração do soro anti botrópico. Foi medicada com adrenalina e encaminhada para Hospital de Referência. Durante a administração do soro antibotrópico (SAB), para realizar dose total de tratamento, a paciente evoluiu com urticária generalizada e desconforto respiratório. Foi administrada adrenalina e interrompida a infusão do SAB. A administração do SAB foi retomada, após estabilização do quadro clínico. Não houve alteração em coagulograma. Durante internação, evoluiu com edema, hematoma, descamação e urticária com placas em membro inferior esquerdo com involução ao 11º dia de internação. Recebeu cefalexina para tratamento de celulite. Recebeu alta hospitalar com cefalexina via oral e anti-histamínico, estável clínica e hemodinamicamente. Comentários: Anafilaxia é definida como uma reação alérgica mediada por anticorpos da classe IgE. Manifesta-se clinicamente por vários sinais e sintomas, como, comprometimento da pele, urticária, angioedema e até mesmo hipotensão, broncoespasmo e arritmias. O SAB é o medicamento mais eficaz para tratar o envenenamento por picada de serpentes do gênero Bothrops (jararaca). Reações adversas podem ocorrer durante a infusão do soro, e em até 24 horas depois da reação anafilática, descrita com pouca frequência. Recomenda-se, se houver reação, interrupção temporária da infusão do SAB e administração de adrenalina subcutânea, e retomada do tratamento após estabilização.