



17 a 20 de maio de 2017

Cuiabá / MT

Trabalhos Científicos

Título: Alergia À Soja,ovo E Leite De Vaca

Autores: CELSO TAQUES SALDANHA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); RAFAEL PIMENTEL SALDANHA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); MAYSA MILLENA DE MATTOS LUZ (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); AILLYN FERNANDA BIANCHI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); THAÍS PONCIANO SILVA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); BRENO HENRIQUE LINDOTE (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); VALDEY ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); LUCAS GABRIEL NUNES PEGORINI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC); NATHALIA SILVA ARAUJO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC)

Resumo: Introdução: Estudos evidenciam que alergia IgE-mediada à soja tem ocorrência raramente isolada e que geralmente vem acompanhada de alergias a outros alimentos. Relato de caso: Genitora refere que seu filho, 2 anos e 4 meses de idade, teve aleitamento materno exclusivo até o segundo mês e que começou a apresentar após esse período, urticárias ao consumir leite de vaca. Mãe orientada em substituir leite do consumo habitual da criança para fórmula de soja. No segundo semestre, ao ingerir ovo, teve novos episódios de urticárias. Nessa ocasião iniciou restrição o ovo além do leite de vaca na dieta do seu filho e manter fórmula de soja. Posteriormente, a criança começou a apresentar dermatite perioral após ingerir hidrolizados de soja. As dosagens de IgE-específicas (método immunocap) evidenciaram: alfa-lactoalbumina: 11,8 ku/l (sensibilidade alta); betalactoglobulina: 8,98 ku/l (sensibilidade alta); caseína: 8,54 ku/l (sensibilidade alta); ovomucóide: 8,14 ku/l (sensibilidade alta) e ovoalbumina: 40,6 ku/l (sensibilidade alta); soja: não realizado. Diante do quadro clínico, corroborado com dosagens de IgE específicas, genitora recebeu informações para excluir também a soja, além do ovo e leite de vaca na dieta do seu filho. Conclusão: Sintomatologia de dermatite perioral frente ao consumo de fórmula de soja são fortemente sugestivas de alergia IgE –mediada a esse alimento, mesmo com ausência na dosagem de anticorpo específico para soja, enfatizando que esse nutriente, juntamente com o ovo e leite de vaca, são responsáveis pelos desencadeamentos das lesões dermatológicas na criança.