



17 a 20 de maio de 2017

Culabá / MT

Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Alergia Alimentar Com Esofagite Eosinofílica E Manifestação Cutânea Atípica

Autores: NAYARA FIRMINO (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ); MARINA WANDALETI AMOROSO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ); ANA CAROLINA DA MATTA AIN (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TAUBATÉ); ANNA PAULA CARELLI (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ); RENAN LUIZ TREML (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ); JOSÉ ROBERTO FRAGA NETO (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ); JOÃO CARLOS DINIZ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ); CIRO JOÃO BERTOLI (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ)

Resumo: Introdução: Esofagite eosinofílica é uma doença crônica, imuno-mediada, caracterizada pela presença de sintomas associados a disfunção do esôfago e histologicamente pela inflamação com predomínio eosinofílico. Comumente está associada a patologias atópicas. De 6 a 25% dos pacientes apresentam concomitantemente alergia alimentar IgE mediada. Relato de caso: M.A.P., 6 anos, masculino, filho de pais não consanguíneos, encaminhado ao ambulatório de alergia aos 3 anos de idade, devido surgimento de pápulas e placas eritemato- verrucosas descamativas de distribuição linear em hemicorpo esquerdo, fixas no mesmo local e sem resposta ao tratamento com corticoterapia tópica. Paciente nunca apresentou alterações gastrointestinais, porém durante a investigação atual apresentou RAST positivo para glúten, trigo e leite de vaca, na endoscopia digestiva alta com biópsia foram identificados 25 eosinófilos em 10CGA, diagnosticado então com esofagite eosinofílica e alergia alimentar associadas, com manifestação cutânea. Iniciado tratamento com corticóide deglutido e dieta de exclusão de glúten, trigo e leite de vaca, passou a apresentar marcadores positivos para doença celíaca e sem apresentar melhora da pele com exclusão dos alimentos específicos. Comentários: A esofagite eosinofílica está cada vez mais prevalente na população pediátrica, porém os sintomas relacionados a disfunção esofagiana muitas vezes são sutis, apresentando diagnóstico tardio. Sendo assim, a obtenção de uma história completa, incluindo histórico e padrões de alimentação, história pessoal e familiar de atopia, são extremamente importantes para o diagnóstico mais precoce. As manifestações cutâneas não são típicas em Esofagite eosinofílica e Alergia alimentar, podendo se apresentar raramente e sob diversas formas na doença celíaca.