



Trabalhos Científicos

Título: Doença De Crohn Em Adolente: Relato De Caso

Autores: MARÍLIA MEDEIROS DE ARAÚJO NUNES (UFCG/HUAC), CÍNTIA FERNANDES ARAÚJO CINTRA, HORTÊNCIA MARIA FERREIRA DE MELO SILVA, TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQUES, MÔNICA CAVALCANTE TRINDADE, BEATRIZ ADELINO BRASILEIRO SILVA, MARIA NELICE MEDEIROS SILVA, HO

Resumo: Introdução: a doença de Crohn (DC) é uma patologia inflamatória intestinal imunomediada que pode acometer o trato gastrointestinal da cavidade oral ao ânus. As manifestações intestinais mais comuns são: dor abdominal, perda de peso, diarreia e hematoquezia. Descrição do caso: DAC, 13 anos, masculino, apresentando episódios de diarreia persistente há 3 meses, perda ponderal de 10 quilos, presença de raios de sangue em fezes esporadicamente, dor e distensão abdominal, além de episódios de êmese intermitentes. Não foi identificado nenhum sintoma extra intestinal. Exame físico de entrada: peso 33,9 Kg e IMC 12,8kg/m². Emagrecido, hipocorado (2+/4+), desidratado, abdome escavado, levemente distendido, hipertimpânico, doloroso a palpação profunda em flanco direito e ruídos hidroaéreos hipoativos. Presença de plicomas em região anal. As alterações nos exames complementares que corroboraram para o diagnóstico foram: anemia carencial (hemoglobina: 8,9g/dl), pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, tomografia computadorizada de abdome com contraste (venoso e oral), revelou espessamento no íleo terminal e válvula ileocecal e linfonodomegalias no flanco/fossa ilíaca direita, colonoscopia evidenciou processo inflamatório desde a válvula íleo-cecal até o íleo-terminal, a análise histopatológica concluiu doença inflamatória intestinal. A terapia inicial para remissão de doença foi dieta enteral exclusiva polimérica. Discussão: o diagnóstico de DC envolve cinco etapas: suspeita clínica, exames laboratoriais, exclusão de outras doenças com diferenciação entre DC e colite ulcerativa, estadiamento da doença e identificação de manifestações extra intestinais. Não há critérios diagnósticos específicos, a doença é confirmada pela combinação da clínica, das características de imagens e análise histopatológica. O caso em questão seguiu o mesmo raciocínio diagnóstico encontrado na literatura. Conclusão: o diagnóstico da Doença de Crohn inicia após a suspeita clínica, com uma anamnese detalhada e exame físico cuidadoso. Neste caso, esses fatores foram indispensáveis para o início da investigação e devem ser sempre valorizados na prática médica.