



Trabalhos Científicos

Título: Fpies Em Paciente Com Aplv: Relato De Caso

Autores: MIRELLA CRISTIANE DE SOUZA (FURB), LUCIANA AMBONI CONTI, ANDRESSA SAORIM, FERNANDA AMORIM STEINGRÄBER, GABRIELA YURI STINGHEN, GIULIA GIACOMINI, ALDO GESSER

Resumo: Introdução: FPIES é a mais grave hipersensibilidade gastrointestinal a alimentos não mediada por IgE. É equivalente em gravidade à reação anafilática, podendo levar o paciente à morte por choque hipovolêmico. Esta síndrome é subdiagnosticada no Brasil e no mundo por ser confundida com gastroenterite viral, sepse, intoxicação alimentar, distúrbio metabólico entre outros. Descrição: Paciente masculino, 6 meses, após 3 horas de ingesta de fórmula à base de leite inicia com cólicas intensas, irritabilidade, diarreia e vômitos incoercíveis. Chega ao pronto socorro em choque hipovolêmico, necessitando de expansão volumétrica e drogas vasopressoras recebendo diagnóstico de choque séptico. Passa a receber somente leite materno, mantendo diarreia, baixo peso, refluxo de difícil controle. Com 1 ano recebe nova dose de fórmula à base de leite, repetindo quadro clínico e sendo internado para expansão volumétrica. Manejado como gastroenterite viral e prescrito soja por diarreia crônica. Na exposição à soja repete quadro clínico. Feita hipótese de FPIES, entrando em dieta isenta de leite e de soja. Durante 1 ano de dieta, recuperação de peso e resolução de sintomas. No TPO em ambiente hospitalar, depois de 3 horas de teste, evolui com choque hipovolêmico e necessidade de manejo de UTI. Volta a estabilização de sintomas com dieta isenta de leite e soja. Conclusão: FPIES pode desencadear uma resposta inflamatória sistêmica com queda de pressão arterial e choque hipovolêmico em 15 a 20 dos pacientes. Se não adequadamente diagnosticada, paciente pode ser reexposto ao alérgeno, podendo acarretar risco de morte. Faz-se necessário investigar FPIES como diagnóstico possível em choque hipovolêmico.