

Trabalhos Científicos

Título: Análise Do Índice De Kotelchuck Modificado Através Do Cartão Da Gestante Do Projeto Zika Vírus Coorte Jundiaí

Autores: DANILA SOARES TAMBALO (FACCAMP); SILVIA MARIA RIBEIRO OYAMA (FACCAMP); SAULO DUARTE PASSOS (FMJ); MARIA MANOELA DUARTE RODRIGUES (FACCAMP); JOHN WESLEY BARBOSA (UNIANCHIETA); ALIF BERTOLDO (UNIANCHIETA); RITA DE CÁSSIA DE AGUIRRES BERNARDES DEZENA (FACCAMP)

Resumo: Introdução: A assistência pré-natal visa assegurar o bem-estar materno e fetal, sendo sua adequação uma condição importante para que se garanta a efetividade do desenvolvimento da gestação. Objetivo: avaliar a adequação da assistência pré-natal em gestantes do Projeto Zika Vírus coorte Jundiaí analisando o Índice de Kotelchuck modificado. Método: trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de análise documental, com resultado preliminar envolvendo uma amostra de 293 puérperas do Projeto Zika Vírus coorte Jundiaí. Os dados foram coletados através do cartão da gestante e do banco de dados Salesforce, no período de novembro de 2016 a junho de 2017. A adequação do pré-natal foi baseada no índice de Kotelchuck modificado. Resultados: A média de idade foi 27,7 anos (dp=7,1), média de consultas por gestante foi 9,0 (dp = 2,99); idade gestacional média de início do pré-natal foi 8,9 semanas (dp = 4,6). Em relação à escolaridade observou-se predominância do ensino médio completo 124 (42%). Em relação à cidade, 204 (69,6%) residem em Jundiaí, Várzea Paulista 30 (10,2%), Cabreúva 7 (2,4%), Campo Limpo Paulista 13 (4,4%), Itupeva 14 (4,8%), Jarinú 8 (2,7%), Louveira 16 (5,5%) e 1 (0,34%) não referido. De acordo com o índice de Kotelchuck modificado, identificou-se pré-natal com resultado intermediário em 235 (80,2%) gestantes, em 48 (16,3%) adequado e em 10 (3,4%) inadequado. Conclusão: Observa-se o predomínio da adequação do pré-natal classificado como intermediário, cujo resultado refere-se às gestantes que iniciaram os cuidados pré-natais antes ou durante o 4º. Mês e fizeram 50 a 79% das consultas, ressaltando que a utilização desse índice não considera outras variáveis qualitativas da assistência pré-natal.