15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia Pediátrica
19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO
Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Retocolite Ulcerativa (rcu) Associada à Pioderma Gangrenoso E Colangite Esclerosante

Autores: MARÍLIA RIBEIRO DE MORAIS RAMOS; JUSSARA MELO DE CERQUEIRA MAIA; HÉLCIO DE SOUSA MARANHÃO; ROSANE COSTA GOMES; PAULO MATOS DE CASTRO; POLIANA ARAÚJO DA SILVEIRA; ANDRÉA GONDIM MENDONÇA; ANA CRISTINA VIEIRA DE MELO

Resumo: Introdução: A retocolite ulcerativa (RCU) é um processo inflamatório superficial, iniciado tipicamente no reto e limitado ao revestimento mucoso do cólon, de forma contínua, sem áreas de mucosa normal entre os segmentos afetados. Fístulas, abscessos e estenoses raramente ocorrem na RCU. Pela intensa atividade inflamatória e localização distal, o quadro clínico caracteriza-se por dor abdominal, diarreia em pequenos volumes, com sangue, e anemia. Descrição do caso: Paciente, 12 anos, com quadro de dor abdominal, diarreia com muco e sangue, inapetência desde os 5 anos de idade, associada a lesões cutâneas ulceradas e dolorosas em membros inferiores, com evolução progressiva. Aos seis anos de idade, foi realizada colonoscopia com biópsia confirmando o diagnóstico de RCU, sendo iniciada terapia com prednisona e sulfassalazina, apresentando melhora dos sintomas inicialmente. Aos onze anos, evoluiu com dor abdominal de forte intensidade, distensão abdominal, icterícia, colúria e hepatomegalia. Biópsia hepática com colangite e pericolangite e fibrose grau II. Colangio-RNM de abdome superior demonstrando alterações das vias biliares intra-hepáticas sugestivas de colangite esclerosante. Prescrita terapia com anticorpo monoclonal anti-TNF, porém a paciente apresentou reação urticariforme. Atualmente em uso de terapia imunossupressora, evoluindo assintomática. Discussão: O pioderma gangrenoso é uma dermatite neutrofílica crônica potencialmente grave. Raramente manifesta-se em criança (menos de 4% dos casos), quando costuma estar associado a outras doenças sistêmicas, principalmente doença inflamatória intestinal, neoplasias malignas e doenças hematológicas. Colangite esclerosante e hepatite autoimune, observadas em 3% dos casos de doença inflamatória intestinal, são mais comuns na RCU do que na DC, e podem levar à cirrose. De maneira geral, 5% dos pacientes portadores de RCU têm evidências de colangite esclerosante, e aproximadamente 70 a 80% dos pacientes com colangite esclerosante apresentam colite crônica. Conclusão: O pioderma gangrenoso e a colangite esclerosante são manifestações extraintestinais que podem estar associadas à doença inflamatória intestinal, principalmente a RCU.

http://www.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/15-congresso-brasileiro-de-gastroenterologia-peditrica/0123-retocolite-ulcerativa-rcu-associada-a-pioderma-gangrenoso.pdf