



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Quais Os Sinais De Prontidão Para Iniciar O Treinamento Ao Toalet?

Autores: KÁTIA SOARES DE OLIVEIRA; LUIGI CARLO DA SILVA COSTA; ISAQUE FELIPE CARVALHO DA SILVA; DANIELLE BRUNO JARDIM; JOSÉ EDUARDO GOMES BUENO DE MIRANDA; NILTON CARLOS MACHADO

Resumo: Objetivos: Conhecer os sinais de prontidão que devem estar presentes na criança às vésperas do início do Treinamento Esfíncteriano Anal (TEA). Metodologia: Estudo transversal e descritivo. Os dados foram coletados exclusivamente pelos pesquisadores a partir de entrevistas com os pais ou cuidadores das crianças atendidas nos consultórios pediátricos de dois hospitais, tendo como base um questionário previamente elaborado e mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A amostra foi composta por 135 crianças, selecionadas ao acaso nos dois hospitais, sendo 53% do sexo masculino e 67% parda. Mais de 99% dos cuidadores eram as próprias mães. O TEA foi iniciado antes dos 18 meses, entre 18 e 30 meses e após os 30 meses em 47% , 44% e 9% respectivamente. O tempo de TEA foi na maioria dos casos de 3 a 6 meses. Os principais sinais de prontidão, em ordem decrescente, presentes em crianças que iniciaram o TEA antes dos 18 meses de idade foram sentar, saber dizer não, reclamar quando suja, falar e imitar os pais; nas crianças que iniciaram o TEA entre 18 e 30 meses, foram sentar, saber dizer não, executar uma tarefa, falar, imitar os pais e reclamar quando suja e nas crianças cujo TEA iniciou-se após os 30 meses, foram executar uma tarefa, sentar, falar, saber dizer não, reclamar quando suja, imitar os pais e saber guardar algo. Não houve diferenças entre os sinais de prontidão mais prevalentes com relação a duração do TEA. Conclusão: A maioria dos pacientes começou o TEA antes dos 18 meses, com a duração do TEA na maioria de 3 a 6 meses. Os sinais de prontidão mais presentes ao início do TEA foram “sentar”, “falar” e “saber dizer não”.