



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**Gastroenterologia  
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E  
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE  
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil  
26 a 29 de março de 2014

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Frequência Da Colangite Esclerosante Primária Em Pacientes Pediátricos Com Doença Inflamatória Intestinal Em Hospital Terciário

**Autores:** ANA CLÁUDIA CRESPIM DA SILVA; ROBERTA VACARI DE ALCANTARA; GABRIEL HESSEL; ELIZATE A LOMAZI; MARIA ANGELA BELLOMO-BRANDÃO

**Resumo:** INTRODUÇÃO Além das formas clássicas, retocolite crônica ulcerativa (RCU) e Doença de Crohn(DC), a associação de DII com colangite esclerosante primária(CEP) representa um subgrupo com características próprias, cujo diagnóstico precoce é de extrema relevância. OBJETIVO: Avaliar a frequência de CEP em pacientes pediátricos com DII em seguimento em hospital terciário PACIENTES E MÉTODOS: Estudo descritivo que avaliou a frequência de CEP em pacientes acompanhados por DII, no Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UNICAMP, entre maio de 2000 e novembro de 2013, com idades variando de 5 meses a 18 anos. RESULTADOS Foram revistos os prontuários de 38 pacientes com média de idade ao diagnóstico da DII de 9,8 anos e mediana de 10,5 anos. Quinze (42,85%) com diagnóstico de retocolite ulcerativa, 18 (51,43%) com DC e 2 (5,72%) tem colite indeterminada. Três pacientes tiveram o diagnóstico de CEP, com idades entre 8 e 10 anos. DISCUSSÃO A CEP foi diagnosticada em 3 de 38 pacientes com DII. A prevalência de CEP em pacientes com DII em seguimento em hospital terciário está de acordo com os dados da literatura mundial. É necessário manter vigilância rigorosa para evitar futuras complicações.