



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Ansiedade De Mães E Crianças Com Constipação Crônica Funcional

Autores: BRUNO DOS SANTOS SANTANA; GISELIA ALVES PONTES DA SILVA; MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA MOTTA

Resumo: Objetivo: Verificar se mães de crianças com constipação crônica funcional apresentam maiores níveis de ansiedade que as mães de crianças não constipadas. Métodos: Os participantes foram recrutados entre os pacientes dos ambulatórios de Gastroenterologia Pediátrica e Puericultura do Hospital das Clínicas da UFPE. Foram considerados casos crianças de 8 a 12 anos de idade que preenchessem os critérios de Roma III para constipação crônica funcional. O grupo comparativo não cumpria este requisito. Foram excluídos portadores de doenças crônicas ou de outros distúrbios gastrointestinais orgânicos ou funcionais. Às mães aplicou-se o “Formulário de relato dos pais” para identificar constipação crônica na criança e no adolescente, o módulo de constipação do questionário de Roma III para adultos e o Inventário de Ansiedade de Beck. Com as crianças foi utilizado o Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders. Resultados: O grupo caso compôs-se de 57 crianças e adolescentes e o comparativo, de 82, e suas mães. As crianças do grupo caso apresentaram mais transtorno de ansiedade de separação que as do grupo comparativo ($p=0,006$) e uma tendência maior a fobia escolar ($p=0,06$). Observou-se ainda que crianças constipadas exibiam mais frequentemente a mesma condição ($p=0,04$). Além disso, as crianças com transtorno de ansiedade de separação demonstraram uma tendência a terem mães mais ansiosas ($p=0,08$). Por sua vez, as mães que apresentavam constipação demonstraram também maiores níveis de ansiedade ($p=0,013$). Conclusões: A constipação crônica funcional envolve uma maior morbidade por transtornos ansiosos tanto nas crianças quanto em suas mães. A ansiedade materna parece relacionar-se à ansiedade infantil e a constipação nas mães àquela apresentada por seus filhos. Contudo, a ansiedade materna não apresenta maior relação com a constipação infantil.