



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**Gastroenterologia  
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E  
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE  
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil  
26 a 29 de março de 2014

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** O Tempo De Aleitamento Materno Pode Retardar Os Sintomas E/ou Sinais Da Clínicos Da Doença Celíaca?

**Autores:** RENATA GONÇALVES ROCHA; DAIANE POSSAMAI MOTA

**Resumo:** Introdução: Estima-se que a doença celíaca acometa entre 0,5 e 1% da população mundial, em estudos recentes no Brasil detectou-se prevalência em doadores de sangue de 1:681 indivíduos em Brasília, 1:286 em São Paulo e, há evidências de acometimento da população brasileira de 0,15 a 1,75%. Objetivo: Verificar se o tempo de aleitamento materno pode retardar os sintomas e/ou sinais da clínica da doença celíaca. Metodologia: Realizou-se um estudo transversal, descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa. A população em estudo foi composta por crianças e adolescentes participantes de um grupo de apoio aos celíacos do Extremo Sul Catarinense. Obteve-se amostra censitária, com total de 28 indivíduos. O critério de exclusão foi não possuir o diagnóstico de doença celíaca. Resultados: A mediana da duração do aleitamento materno foi 6 meses, com percentil 25% de 4 meses, percentil 75% de 9,5 meses, mínimo de zero meses e máximo de 36 meses. A introdução de glúten na dieta teve média 7,19±3,22 meses. A idade do início dos sintomas/sinais apresentou média 4,12±3,85 anos. A média da idade ao diagnóstico foi 5,12±3,95 anos. Encontrou-se correlação de Kendall moderadamente positiva entre a duração do aleitamento materno e a idade de início dos sintomas/sinais ( $r=0,404$ ;  $p=0,008$ ). Conclusão: A mediana de duração do aleitamento materno foi 6 meses, a introdução de glúten na dieta teve média 7,19 meses, os sintomas/sinais iniciaram em média com 4,12 anos, a média da idade ao diagnóstico foi 5,12 anos. A literatura sugere que o tempo de aleitamento materno mais prolongado influencia em mudança da apresentação clínica da doença celíaca, porém, permanece controverso se a proteção seria permanente ou apenas atrasa o início da doença. Sobre a idade da introdução de glúten em relação ao risco de desenvolvimento da doença celíaca faltam evidências, assim, orienta-se associar a introdução do glúten durante o aleitamento materno.