



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Doença Metabólica Como Diagnóstico Diferencial De Vômitos E Refluxo Em Lactente: Relato De Caso.

Autores: MIRELLA CRISTIANE DE SOUZA; TUAMI VANESSA WERLE; ALINE OLIVETI; ANDREA CERUTTI HANEMMANN

Resumo: **INTRODUÇÃO** O refluxo fisiológico é comum no lactente, atingindo 67% dos pacientes entre 2 a 4 meses reduzindo a 5% no final do primeiro ano de vida. 3 a 5% dos lactentes regurgitadores podem ter DRGE, mantendo clínica acima desta idade. Embora muito prevalente em pacientes abaixo de 1 ano, não deve ser o único diagnóstico cogitado. **DESCRIÇÃO DO CASO** Paciente masculino, 9 meses, inicia com vômitos com 1 mês de idade de intensidade progressiva e sem relação entre sólidos e líquidos. Não responder a fórmulas espessadas, a antagonista H₂, a procinético e inibidor de bomba. Tem de 1 mês de idade aos 9 meses ajustado posologia das medicações acima sem melhora e sem exames complementares. Com 10 meses inicia com regressão nos marcos de desenvolvimento e com crise convulsiva. Interna em UTI em estado de mal com intensa acidose metabólica. Coletado erros inatos do metabolismo com diagnóstico de acidúria metilmalônica. Com a correção da acidose e da doença de base paciente não teve mais vômitos. **DISCUSSÃO** A causa de vômitos em lactentes abaixo de 1 ano embora muito associado a refluxo, tem seus diagnósticos diferenciais. A evolução natural no refluxo fisiológico é melhora progressiva com o passar da idade e com o espessamento progressivo da dieta. No caso da doença do refluxo a evolução natural é boa resposta a controle dietético e medicamentoso. **CONCLUSÃO** Vômitos de evolução contrária a história natural de refluxo e DRGE deve fazer lembrar dos diagnósticos diferenciais. A pronta elucidação através de exames complementares deve ser cogitada nestes casos. No caso de doença metabólica o diagnóstico deve ser suspeitado prontamente pelos danos que pode acarretar.