



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Clínico E Nutricional De Pacientes Com Doença Celíaca Atendidos Em Um Serviço De Gastroenterologia Pediátrica.

Autores: DEBORAH NUNES DE ANGELI; MÁRIO CÉSAR VIEIRA; KARIN KNABBEN DE SOUZA; SABINE KRÜGER TRUPPEL; LUCIANA BANDEIRA MENDEZ RIBEIRO; DANIELLE REIS YAMAMOTO; GIOVANA STIVAL DA SILVA

Resumo: Objetivo: Determinar as características clínicas e o estado nutricional dos pacientes com doença celíaca atendidos em um serviço de referência em gastroenterologia pediátrica. Métodos: Estudo retrospectivo descritivo por meio da revisão de prontuários de pacientes atendidos no período de janeiro de 1995 a agosto de 2013, com análise da apresentação clínica e avaliação do estado nutricional ao diagnóstico e três meses após o início do tratamento. Resultados: Foram avaliados 249 pacientes, 61% do sexo feminino. A mediana da idade ao diagnóstico foi de 32 meses (9-24). A média de aleitamento materno exclusivo foi de 3 meses (DP+ 2,25). A idade ao início dos sintomas foi de 14 meses (3-168). A média de idade à introdução do glúten na dieta foi de 5,37 meses (DP+ 1,36). O intervalo de tempo entre o início da dieta com glúten e início dos sintomas foi de 8 meses (0-162). O intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 7 meses (0-231). Os sintomas mais frequentes incluíram: diarreia (56,88%), baixo ganho ponderal (55,55%), distensão abdominal (47,11%), vômitos (23,55%), dor abdominal (20%), baixa estatura (18,66%). Ao diagnóstico, a média do escore z de peso/idade foi de -1,77 (DP+ 1,36), de estatura/idade -1,63 (DP+ 1,42), de peso/estatura -1,32 (DP+ 1,17) e IMC/idade -0,98 (DP+ 1,16). Após três meses de tratamento a média do escore z de peso/idade foi de -0,72 (DP+ 1,30), de estatura/idade -1,46 (DP+ 1,47), de peso/estatura 0,25 (DP+ 1,11) e IMC/idade 0,16 (DP+ 1,29). Conclusões: Conclui-se que uma vez estabelecido o diagnóstico é possível começar o tratamento levando a recuperação nutricional mesmo num curto período de tempo.