15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia Pediátrica
19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO
Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados Ao Aleitamento Materno Prolongado: Revisão Sistemática De Literatura

Autores: GÉSSICA SILVA SANTANA; GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA; TATIANA DE OLIVEIRA VIEIRA

Resumo: INTRODUÇÃO: Apesar da excelência do aleitamento materno (AM), o desmame precoce é elevado. Contudo, existem mães que amamentam seus filhos além do primeiro ano de vida. OBJETIVO: Identificar os fatores associados ao AM prolongado. METODOLOGIA: A pesquisa bibliográfica teve como base de dados Pubmed/MEDLINE. Os termos usados, separados e combinados foram: human milk, breast milk, breast feeding, breastfeeding, long-t, continu, sustain, exten, prolong, factor, determ, predict, review. O símbolo * foi utilizado para completar as palavras cortadas. Incluíram-se artigos que analisavam os fatores associados à amamentação em crianças de 12 meses de idade ou mais, que fossem de língua portuguesa ou inglesa e publicados entre 1993-2013. Foram excluídos artigos de revisão, estudos qualitativos e artigos sem acesso gratuito. RESULTADOS: Foram encontrados 2.532 artigos dos quais 237 foram selecionados a partir da leitura dos títulos, 36 foram selecionados a partir da leitura dos resumos e aplicação dos critérios de seleção. Os 36 artigos selecionados foram, lidos na íntegra, restando 8 artigos que atendessem aos critérios metodológicos.Trinta e um fatores associados ao AM em crianças com idade igual ou superior a 12 meses foram identificados, os quais podem ser agrupados em variáveis demográficas, socioeconômicas, assistência pré-natal e pós-natal imediata e tardia. Um dos estudos não encontrou nenhum fator associado ao AM prolongado. CONCLUSÃO: Somente um estudo brasileiro atendeu aos critérios de seleção da pesquisa. Apesar da escassez de estudos que analisam os fatores associados ao AM prolongado, é de grande importância o seu conhecimento o que possibilita a identificação de grupos de risco e, consequentemente, a intervenção precoce a fim de se garantir um adequado padrão alimentar para a população infantil durante todo o seu crescimento e desenvolvimento.

http://www.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/15-congresso-brasileiro-de-gastroenterologia-peditrica/0299-fatores-associados-ao-aleitamento-materno-prolongado.pdf