



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**Gastroenterologia  
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E  
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE  
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil  
26 a 29 de março de 2014

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Manifestações Gastrointestinais Da Hemangiomatose Neonatal Difusa Em Lactente. Relato De Caso

**Autores:** MILENA RIOS SANTOS; SARA PIMENTEL; MARCIA SANTOS DA SILVA; MATHEUS AMARAL DA ROCHA; JOÃO EUGÊNIO M.T. DIAS; LENISE OLIVEIRA; ROBERTO SAPOLNIK; CIBELE FERREIRA MARQUES ; LUCIANA RODRIGUES SILVA

**Resumo:** Introdução: Os hemangiomas são os tumores vasculares mais comuns na infância, contudo na forma de hemangiomatose neonatal difusa (HND) apresenta menor incidência. A sua principal característica é o acometimento extracutâneo envolvendo o trato gastrointestinal (52%), fígado (64%), sistema nervoso central (52%), e pulmões (52%). O diagnóstico é clínico e os exames de imagem contribuem para diagnóstico mais precoce. Descrição de Caso: Lactente, 37 dias de vida, nascida a termo, sem intercorrências neonatais. Admitida com queixa de ganho de peso inadequado, hipoatividade e anemia. Com instabilidade hemodinâmica foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva onde apresentou enterorragia maciça e sinais de abdome agudo. Submetida à laparotomia exploradora de urgência, que revelou três perfurações em íleo terminal, sendo realizada enterectomia com preservação da válvula íleo-cecal. Manteve episódios de melena sendo necessária nova abordagem cirúrgica com outra enterectomia. Exames de imagem evidenciaram hemangiomatose infiltrativa e difusa no intestino e lesões em fígado e pulmão. Anatomia patológica identificou hemangioma cavernoso tipo difuso. Evoluiu com melhora clínica e recebeu alta hospitalar em uso de corticoterapia, após ganho de peso adequado sem novos sinais de sangramento. Discussão: A hemangiomatose difusa neonatal é uma condição clínica rara e manifesta-se mais comumente no período neonatal. Apresenta complicações potencialmente graves como foi relatado neste caso. A investigação clínica deve ser ampliada devido à possibilidade de envolvimento de diversos órgãos associado à ausência de sinais ou sintomas específicos da doença. Conclusão: Associada a altas taxas de morbimortalidade, a HND deve ser investigada e diagnosticada precocemente com o intuito de melhora da sobrevida dos seus portadores.