



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título:

Autores: AMÂ•LIA LUSTOSA; HILDENIA RIBEIRO; EDNA ROCHA; FABIANA SILVA; DANIELE LAFUENTE; MIKAELE MARQUES; MÃ”NICA FRAGA; MARTA SILVA; JÃŠLIA TEIXEIRA; GISELA DEL AGUILA

Resumo: OBJETIVOS: O tratamento da AVBEH Ã© a Portoenterostomia de Kasai (PK) e o mais importante fator prognÃ³stico Ã© o tempo atÃ© a realizaÃ§Ã£o dessa cirurgia. Esse estudo objetiva identificar a idade que as crianÃ§as estÃ£o sendo encaminhadas para o Centro de referÃªncia, quantas delas realizaram PK, quantas foram encaminhadas para o centro de transplante hepÃ¡tico (CTH), Ãrea de origem dessas crianÃ§as e achados das amostras de BiÃ³psia HepÃ¡tica (BH). MÃ‰TODOS: Foram revisados 19 prontuÃ¡rios de pacientes com SÃndrome colestÃ¡tica do lactente entre setembro de 2010 e setembro de 2012. Nos pacientes diagnosticados como portadores de AVBEH, todas as PK foram realizadas pela mesma equipe. ClassificaÃ§Ã£o da idade do momento cirÃºrgico: AtÃ© 59 dias e de 60 a 89 dias. CrianÃ§as com idade acima de 90 dias foram referidas para CTH. RESULTADOS: 12 pacientes (63,1%) apresentavam AVBEH e aqueles referidos do interior do estado chegaram em idade mais avanÃ§ada. 05 pacientes(41,7%) chegaram com idade acima de 90 dias sendo todas referidas ao CTH. 05 pacientes (41,7%) chegaram entre 60 a 89 dias e 02 (16,6%) chegaram com idade menor que 59 dias. Pacientes desses 02 Ãºltimos grupos foram submetidos Ã PK. As biÃ³psias mostraram que 11(91,6%) apresentavam desarranjo estrutural do fÃgado, 05 (41,6%) rosetas, 12(100%) plugs biliares e proliferaÃ§Ã£o ductal e 07 (58,3%) apresentavam cÃ©lulas gigantes. CONCLUSÃ£o: O encaminhamento dos pacientes com SÃndrome ColestÃ¡tica ainda se faz de maneira lenta, dificultando um diagnÃ³stico precoce de AVBEH, atrasando a realizaÃ§Ã£o da PK. Todos os pacientes com AVBEH apresentavam algum comprometimento hepÃ¡tico e todos tinham plugs biliares e proliferaÃ§Ã£o ductal Ã s biÃ³psias.