15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia Pediátrica
19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO
Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Reporte De Un Caso De Capillaria Hepatica

Autores: SILVIA MORISE; LUCILA LÓPEZ GIACINTI; REINALDO FRAMARIN; ESTELA ALVAREZ; GRACIELA PELUFFO; PATRICIA CAGLIO

Resumo: Paciente de 2 años de edad, proveniente de zona suburbana que habita en una vivienda sin servicios básicos. Consulta por fiebre persistente de 15 días de evolución. Al examen físico se haya emaciado, con hepatoesplenomegalia. La anamnesis revela un marcado hábito de pica. Laboratorio de ingreso: Hto 28 %, GB 17100/mm3 con eosinofilia 30%, transaminasas y LDH aumentadas, PCR cuantitativa 13.5mg, Albúmina 2.6 g/dL, TP 24,6” Porcentaje actividad 35%, RIN 1,2, KPTT 36”. Ecografía: hígado y bazo aumentado de tamaño y ecogenicidad. Serología: HIV, HCV, HBV, CMV, Mycoplasma, EBV negativo. Toxocara sp positivo. Anticuerpos FAN, ASMA, anti LKM, negativos. Fondo de ojo normal. PAMO y biopsia de médula ósea descarta síndrome mieloproliferativo. Por presentar síndrome hipereosinofílico y mala evolución clínica se administra metilprednisolona IV y albendazol. AL normalizar la coagulación se realiza Biopsia hepática. Cultivo bacterilógico y estudio micológico negativo. Examen microbiológico en fresco: huevos característicos identificados como C. hepática. Anatomía Patológica: hepatitis granulomatosa con incontables huevos de Capillaria Hepática que confirma el diagnóstico. El niño completa tratamiento con corticoides durante 4 semanas con mejoría clínica y disminución progresiva del tamaño del hígado y bazo. Comentario: La capillariasis hepática es un cuadro muy infrecuente. Hasta comienzos de esta década sólo se habían publicado 85 casos en el mundo. Es un parásito nematode que se encuentra en el hígado de roedores y otros animales, siendo el hombre un huésped accidental. Se han descripto presentaciones clínicas leves a graves, con casos fatales. Las condiciones sanitarias deficientes y el hábito de pica son los principales factores de riesgo para esta patología

http://www.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/15-congresso-brasileiro-de-gastroenterologia-peditrica/0323-reporte-de-un-caso-de-capillaria-hepatica.pdf