15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia Pediátrica
19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO
Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Hipertransaminemia Como Expresion De Enfermedad Celiaca En Paciente Con Dermatomiositis

Autores: NINA COLINA; GREICY SUAREZ ; MARIANA ARANA; AILIM CARIAS ; ANDREA VERENZUELA ; JESSICA FRANCO ; MIROSLAVA RODRIGUEZ; HENRY PRATO; ANA ANTELO

Resumo: Introducción: La hipertransaminemia responde a causas hepáticas y no hepáticas, dentro de las últimas destacan la Enfermedad Celíaca, alteraciones hereditarias del metabolismo muscular, enfermedades musculares adquiridas y el ejercicio extenuante. La Dermatomiositis Juvenil es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo de etiología desconocida. Su incidencia se estima en 3 casos por millón de niños. Su asociación a determinados antígenos HLA de clase I y II, y su respuesta a tratamientos inmunosupresores sugieren una base autoinmune. Se describe caso de preescolar de 2 años de edad, masculino con diagnóstico de Dermatomiositis en tratamiento con esteroides con poca mejoría y persistencia de hipertransaminemia siendo referido a la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Dr. “Carlos Arvelo”. Se realiza anticuerpos transglutaminasa (Ig G/I gA) resultando positivos, de igual manera predisposición genética HLA- DQ2 DQ8. Hallazgos de Biopsia de intestino delgado: Enfermedad celíaca tipo 2 (lesión hiperplásica) de la clasificación modificada de MARSH. Se indicó dieta exenta de gluten, lográndose mejoría clínica y resolución de hipertransaminemia. Discusión: La presencia de hipertransaminemia en pacientes con Enfermedad Celiaca es frecuente, su condición autoinmune hace necesario su relación con patologías inmunológicas. Cuando un paciente presenta enfermedad autoinmune y EC, ésta última entidad es frecuentemente silente, y por ende lo habitual es que la enfermedad autoinmune sea diagnosticada primero. Conclusión: Dado lo inusual de casos con Dermatomiositis y Enfermedad Celiaca el objetivo de la descripción del caso es mostrar nuestra experiencia y la satisfactoria evolución del paciente

http://www.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/15-congresso-brasileiro-de-gastroenterologia-peditrica/0344-hipertransaminemia-como-expresion-de-enfermedad-celiaca.pdf