



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Doença De Crohn De Início Precoce: Dificuldades No Diagnóstico E Tratamento

Autores: CAMILA MARQUES DE VALOIS LANZARIN; JULIANA TIEMI SAITO KOMATI;
LETICIA HELENA CALDAS LOPES; VERA LUCIA SDEPANIAN

Resumo: Introdução: A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal de etiologia multifatorial. Cerca de 25% dos pacientes têm primeira apresentação na infância e adolescência. Dados descritivos destacam características fenotípicas únicas para a doença pediátrica. A escolha do tratamento deve avaliar a localização da doença, extensão e impacto no crescimento e recuperação de peso e estatura. O diagnóstico, especialmente antes de 2 anos, constitui desafio. Relato de caso: Paciente termo, aleitamento materno exclusivo, iniciou aos 4 meses com diarreia com sangue, irritabilidade, inapetência e cólica. Aventada hipótese de alergia à proteína do leite de vaca, porém sem resposta à dieta de exclusão, tampouco com introdução de hidrolisado proteico exclusivo. Hemograma com plaquetose, aumento de VHS, endoscopia com úlcera esofágica e pangastrite erosiva intensa e colonoscopia com colite ulcerativa. Introduziu-se fórmula de aminoácido sem melhora. Iniciado corticoide. Apresentou novamente sintomatologia após retirada do corticoide. Reiniciado corticoterapia, introduzido mesalazina e iniciado acompanhamento em ambulatório de referência onde se aventou hipótese de doença de Crohn com diagnóstico diferencial com mutações ligadas a interleucina-10. Iniciada azatioprina. Não foi possível reduzir o corticoide por recidivas. Indicado uso de imunobiológico, porém pela impossibilidade de acesso venoso não foi possível administração de infliximabe. Nova colonoscopia e endoscopia digestiva alta demonstraram desaparecimento de grande parte das lesões, porém sem remissão, mantendo lesões em cólon direito e microscopia com granuloma não caseoso confirmando a hipótese de doença de Crohn. Iniciado adalimumabe. Discussão: Atualmente observamos lactentes com sintomas sugestivos de doença inflamatória intestinal. Os principais diagnósticos diferenciais nesta faixa etária são as mutações da interleucina-10. Nesse caso enfatiza-se necessidade de experiência clínica com terapia biológica, que deve ser confirmada quanto à eficácia e segurança nessa faixa etária.