



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil

26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Acometimento Hepático Na Doença Celíaca

Autores: ANA PAULA TAVARES SOUZA; SILVIO DA ROCHA CARVALHO

Resumo: Objetivo: Discutir as relações entre a doença celíaca (DC) e os tipos de alterações hepáticas. Métodos: Revisão dos prontuários dos pacientes com diagnóstico de DC e pesquisa na literatura através do banco de dados Medline (Pubmed e Mdconsult), em artigos escritos em inglês, no período de 2008 a 2013, usando como palavras-chave: “celiac disease” and “hepatitis”. Resultados: A DC é uma enteropatia imuno-mediada que ocorre pela ingestão do glúten em indivíduos geneticamente susceptíveis. O diagnóstico requer alterações histológicas na mucosa duodeno-jejunal (aumento dos linfócitos intraepiteliais, atrofia vilositária e hiperplasia de criptas) associados à presença de marcadores sorológicos positivos, havendo remissão clínica e negatificação sorológica com dieta isenta de glúten. O envolvimento hepático tem sido freqüentemente descrito em pacientes celíacos. Condições como hipertransaminasemia reversível com a dieta isenta de glúten, hepatite auto imune e outras hepatopatias crônicas como a hepatite crônica pelo vírus C. A hipertransaminemia parece estar associada à lesão da mucosa intestinal e pode ser causada não somente por reações imunes, mas também por substâncias tóxicas endógenas ou exógenas, absorvidas pelo intestino. A lesão hepática pode ser secundária à desnutrição. É reversível em 12 meses de dieta isenta de glúten. Há descrição de casos esporádicos de Hepatite auto-imune ou de colangite esclerosante associados a DC. A Hepatite auto-imune (HAI) e a DC frequentemente compartilham haplótipos HLA semelhantes (HLA DR3-DQ2 ou DR4-DQ8). A DC pode ser desencadeada por agentes infecciosos que ativam reações imunológicas e desencadeiam o fenômeno da autoimunidade. Suspeita-se que a infecção crônica pelo vírus C da hepatite desencadeie uma resposta celular inflamatória específica ao HLA-DQ2. Conclusões: A DC é uma patologia sistêmica com envolvimento primário do intestino delgado. Estão descritas várias manifestações hepáticas, como hipertransaminemia , associação com doenças hepáticas autoimunes e hepatopatias crônicas. Apesar de raramente necessária, a biópsia hepática pode ser determinante em casos selecionados.