



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Desmame Precoce Como Fator Predisponente Da Alergia Alimentar

Autores: ELLEN MARIA CUSTODIO DOS SANTOS; ANDREZA TALLYNE DE AGUIAR SILVA; ADRIANA MARIA DA SILVA; HUANA RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA; IZABELA DOS SANTOS PEREIRA; TAMYRIS GOMES DA SILVA SANTOS

Resumo: Introdução: As reações adversas aos alimentos são representadas por qualquer reação anormal à ingestão de alimentos ou aditivos alimentares. (SAMPSON, 2004) A alergia alimentar é mais comum em crianças. Estima-se que a prevalência seja aproximadamente de 6% em menores de três anos e de 3,5% em adultos e estes valores parecem estar aumentando. (STRACHAM, 1989; SICHERER et,al.,2000). Oferecer à criança alimentos que não o leite materno antes do sexto mês de vida é em geral desnecessário e podem deixar a criança mais vulnerável a diarreias, infecções respiratórias, alergias e desnutrição, que podem levar ao comprometimento do crescimento e do desenvolvimento. (SAMPSON, 1999). Objetivo: Observar através da literatura a relação do desmame precoce como fator indutor da alergia alimentar. Metodologia: Para concretização do presente trabalho foi realizado pesquisas na literatura, tendo a utilização de artigos científicos. Resultados: Apesar de o leite materno ser de suma importância para o neonato, a prática da amamentação vem sofrendo ao longo do tempo a influência de diversos fatores tanto sócio-econômicos quanto culturais que contribuem para o seu declínio. Um destes é a inserção das mulheres no mercado de trabalho. (ALMEIDA e RAMOS, 2003). Essa crença de que o leite materno não é completo para suprir as necessidades da criança, tem resultado na introdução de outros leites não maternos e alimentos complementares antes do tempo apropriado. (CARRASCOZA et,al.,2009) O leite de vaca é um dos principais substitutos do leite materno nos primeiros meses de vida, o que resulta na exposição precoce do antígeno ao trato gastrointestinal imaturo do lactente, gerando casos alérgicos. (CAULFIELD et,al.,1996). Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados, é possível perceber que o desmame precoce está cada vez se tornando uma pratica comum. Este ocorre concomitantemente com a introdução alimentação complementar, o que deixa o neonato com maior suscetibilidade à alergias alimentares.