



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Pseudo-obstrução Crônica Como Manifestação De Alergia Alimentar ?

Autores: ROSA GUSMAO; DANIELA IMBIRIBA

Resumo: Pseudo-obstrução intestinal crônica (POIC) como manifestação de alergia alimentar? POIC é definida como sinais sintomas decorrentes da interrupção do fluxo do conteúdo intraluminal do trato gastrointestinal ,na ausência de obstrução orgânica. Pode ser congênita ,quando ocorre desde o nascimento e crônica quando persiste além dessa idade. Alterações no sistema nervoso ou muscular estão envolvidas na fisiopatologia. Lactente , sexo masculino, de 5meses ,procedente do interior Pará , história de dificuldade para evacuar desde o nascimento – só evacuava com uso de laxantes e enemas. Ao nascimento apresentou com quadro de obstrução intestinal importante, vômitos biliosos ,eliminação de mecônio com uso de supositório no segundo dia de vida. Encaminhado para Cirurgia Pediátrica , com HD de íleo meconial , megacolon congênito ?Exames : enema opaco –inconclusivo, Biópsia retal à 4cm e à 2cm da linha pectínea : plexos submucosos com presença de células ganglionares. Alta com LM, lactulose , enemas .PN 3.800Kg,C 50 cm ,a termo. Nega megacolon na família . Exame físico: distensão abdominal intensa, sem visceromegalias. P= 7.645Kg, C= 67cm, PA =52cm. PC=43cm. Alimentação fórmula com PLV; medicação : lactulose , enemas, antiespasmódicos diários . Enema opaco : megacolon, sem sinais obstrutivos . Passou a evacuar espontaneamente com uso exclusivo de fórmula de aminoácidos . Reaparecimento dos sintomas com PLV (3 tentativas). IgE (RAST) PLV negativa, Hb 10,2,Eos 2,0%. Atualmente em uso exclusivo de fórmula de aminoácidos , evacuações espontâneas ,sem medicações. Mantem distensão abdominal . Várias causas são implicadas na ocorrência de POIC na criança : pós cirurgias, doença celíaca, D. Kawasaki, diabetes melito . Conclusão : POIC pode constituir uma dismotilidade causada por reações imunológicas à PLV e deve ser lembrada nestes casos , principalmente quando ocorre uma boa resposta com o uso de fórmula de aminoácidos, após testes de desencadeamentos .