



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**Gastroenterologia  
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E  
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE  
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil  
26 a 29 de março de 2014

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Doença Inflamatória Intestinal - Perfil Dos Pacientes Em Dois Hospitais Pediátricos De Porto Alegre - Rs

**Autores:** MARÍLIA ROSSO CEZA; CÍNTIA STEINHAUS; MELINA UTZ MELERE; RAQUEL BORGES PINTO; BEATRIZ JOHN; ANA REGINA RAMOS; RENATA ROSTIROLA GUEDES; EDUARDO MONTAGNER DIAS; MATIAS EPIFANIO; CRISTINA TARGA FERREIRA

**Resumo:** Gastroenterologistas pediátricos devem, além de ter em mente os sintomas comuns à DII, reservar especial atenção aos aspectos particulares na pediatria, como retardo no desenvolvimento, demora no diagnóstico e efeitos colaterais das medicações usadas. **Objetivo:** apresentar o perfil clínico e demográfico dos pacientes com DII, em dois hospitais pediátricos de Porto Alegre. **Método:** estudo retrospectivo com revisão de prontuários, avaliando o perfil clínico e demográfico de pacientes com DII, atendidos durante o ano de 2013. **Resultados:** 32 pacientes portadores de DII, sendo 50% do sexo feminino e 91% caucasianos. 18 pacientes (56%) eram portadores de Doença de Crohn (DC), 13 (41%) de Colite Ulcerativa (RCU) e 1 de Colite indeterminada (CI). A média de idade foi de 13 anos e o tempo médio para o diagnóstico foi de 17 meses, variando de 1 mês a 9 anos. 44% dos pacientes apresentavam anemia ao diagnóstico e 38% eram desnutridos. Dos pacientes com DC, 10 (55%) tinham acometimento íleo-colônico, sendo que 6 destes (60%) apresentavam também TGI alto comprometido. O cólon foi acometido isoladamente em 7 pacientes (39%) e apenas íleo, em 1 paciente. A histologia mostrou granuloma em 15 pacientes (83%). Dos com RCU, 7 apresentavam pancolite (54%). O tratamento inicial mais utilizado foi corticoide e mesalazina em 14 pacientes (50% destes, DC). Seis receberam apenas mesalazina (todos RCU). Azatioprina e corticoide foram usados em 7 pacientes (todos DC). Dos que usaram corticoide, 9 (39%) eram corticodependentes e nenhum corticorresistente. Sete pacientes (39% dos com DC) fizeram uso de medicamentos biológicos (7 infliximab e 1 adalimumab). **Conclusão:** A idade de apresentação da DII é variável, predominando na adolescência. O tempo para o diagnóstico foi amplo, alguns com muita demora. Deve-se suspeitar desta doença ainda na infância, visando diminuir a repercussão no crescimento e desenvolvimento destes pacientes quando diagnosticados tardiamente.