



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Antropométrica De Crianças De 06 A 60 Meses Com Queixa De Baixo Apetite

Autores: SANDRA SANTOS VALOIS; FERNANDA ORRICO FARIAS; BRUNA NABUCO FREIRE SIQUEIRA; JULIANA APARECIDA BONFIM SANTOS; CAROLINE MUNFORD DA SILVA DE JESUS; EVILYN NATÁCIA DOS SANTOS CARVALHAL; ÂNGELA PEIXOTO DE MATTOS ; HUGO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

Resumo: Objetivo: avaliar o estado nutricional de crianças de 06 a 60 meses com hiporexia. Métodos: estudo de corte transversal, desenvolvido nos Ambulatórios de Nutrologia Pediátrica do CPPHO – Complexo HUPES. Realizou-se amostra por conveniência compreendendo todos os lactentes e crianças atendidos entre agosto de 2012 a março de 2013. Critérios de inclusão: idade entre 06 e 60 meses e queixa de hiporexia há pelo menos 01 mês pelos pais/responsáveis. Critérios de exclusão: intercorrência clínica identificada na consulta, doença crônica, desnutrição grave segundo o índice P/A e não consentimento dos pais/responsáveis. O peso foi mensurado em balança digital. O comprimento dos < de 2 anos foi realizado em infantômetro. Nos > de 2 anos a estatura foi aferida por meio do estadiômetro. Para avaliação antropométrica utilizou-se o escore Z dos indicadores P/I, P/A e A/I da referência OMS. Os dados foram tabulados e analisados no software Statistical Package for Social Science na versão 20.0. Resultados: foram incluídas 25 crianças, 56% (n=14) do gênero masculino. A idade média foi de $35,8 \pm 14,32$ meses, sendo apenas 01 (4%) participante com idade inferior a 12 meses. Com relação à renda familiar 52% (n=13) das famílias apresentavam renda $\geq$ 01 salário mínimo. Verificou-se que 88% (n =22) das crianças tinham peso adequado para altura e 12% (n= 3) demonstraram inadequação. Com relação aos indicadores P/I e A/I pode-se identificar adequação em 92% (n= 23) dos participantes. O valor mediano em z escore do P/I foi de -1,27 (IQ: - 0,965), do P/A de -0,87 (IQ:- 0,85) e do A/I de -1,11 (IQ: -0,88). Conclusão: apesar da queixa de apetite reduzido, a maioria das crianças não apresentou comprometimento dos indicadores P/I, P/A e A/I. Sugere-se que possa haver percepção equivocada dos pais quanto a adequação da dieta consumida por seus filhos.