



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil

26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Achados Das Endoscopias Digestivas Altas Eletivas Em Crianças E Adolescentes Realizadas Em Um Hospital Terciário Do Distrito Federal No Período De Março A Outubro De 2013.

Autores: ALESSANDRA DOS SANTOS DOMINGUES; ANA CATARINA GADELHA ANDRADE; RAQUEL SOUSA PASSOS; ANA AURELIA ; TECIO ; WALLACE ACIOLI FREIRE DE GOIS; MARLON DE JESUS; ELISA DE CARVALHO

Resumo: Objetivo: Traçar o perfil dos exames de endoscopia digestiva alta diagnóstica, realizados eletivamente em crianças e adolescentes em um hospital terciário do distrito federal. Metodologia: Realizou-se um estudo retrospectivo descritivo com pacientes pediátricos encaminhados ao serviço de endoscopia digestiva alta do hospital terciário do DF de março a outubro de 2013. As variáveis avaliadas foram idade média, gênero, indicações do exame, achados macroscópicos e histopatológicos. Resultados: Foram realizadas 390 endoscopias em entre março e outubro de 2013. A idade média foi de 9,1 + 4,56 anos e a distribuição por sexo foi homogênea (masculino 50,77%, feminino 49,23%). As principais indicações endoscópicas foram dor abdominal (35,90%) e disfagia (16,41%). A macroscopia do esôfago foi normal em 58,72% dos pacientes, a do estômago em 69,74% e a do duodeno em 79,23%. Entre os achados patológicos do esôfago a estenose não cáustica e a esofagite foram os achados macroscópicos mais comuns (12,31 e 8,21% respectivamente), já no estômago e duodeno os achados foram a gastrite e duodenite não erosivas (16,5% e 6,41% respectivamente). Avaliando-se as indicações por gênero notou-se um predomínio da dor abdominal como indicação preponderante no sexo feminino (50%), e um equilíbrio entre dor abdominal e disfagia no sexo masculino (22% cada). Dentre as biópsias realizadas, o principal achado patológico foi a gastrite crônica *Helicobacter pylori* negativa (34, 87%). Após a biópsia o segundo procedimento mais realizado foi à dilatação esofágica, o que se explica pelo serviço ser referência estadual neste procedimento. Conclusão: Os dados encontrados neste estudo corroboram com os descritos da literatura de que a principal indicação de EDA na faixa etária pediátrica continua sendo dor abdominal, preponderante no sexo feminino neste estudo. Atualmente a endoscopia é parte integrante e fundamental da prática clínica da gastroenterologia pediátrica.