



15º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Gastroenterologia
Pediátrica**

19º CONGRESSO LATINO AMERICANO E
10º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE
GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E NUTRIÇÃO

Centro de Convenções de Natal . RN . Brasil
26 a 29 de março de 2014

Trabalhos Científicos

Título: Baixo Peso Ao Nascer Em Coorte De Recém-nascidos Vivos Em Um Município Do Alto Sertão Da Paraíba

Autores: FERNANDA PEDROSA DE FIGUEIREDO; OLINDINA BARBOSA GADELHA; SYMARA ABRANTES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CABRAL

Resumo: Objetivo: Analisar o peso ao nascer de recém-nascidos vivos do ano de 2012, em Cajazeiras-PB, identificando os casos de baixo peso ao nascer (BPN) e suas condicionalidades. Método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo tendo por instrumento de pesquisa as Declarações de Nascidos Vivos (DNSs) no ano de 2012, nas quais foram consultados os seguintes dados: peso ao nascer, número de consultas pré-natal e tipo de parto. Para tabulação e mapeamento de dados foi utilizado o programa Excel. A análise dos dados foi realizada segundo estatística descritiva simples. Resultados: Neste período tem-se um quantitativo de 518 nascidos vivos com residência no município de Cajazeiras-PB, entre estes a incidência de BPN (menor que 2500g) foi de 6,949%. Com relação ao tipo de parto, observou-se uma maior prevalência do parto cesáreo (57,916%) em relação ao parto vaginal (41,698%), não sendo especificados o tipo de parto em 0,386% dos nascimentos. Observou-se uma boa cobertura pré-natal, onde 63,128% das mães realizaram mais de 7 consultas; 31,853% entre 4 e 6 consultas; 3,861% entre 1 e 3 consultas e 0,386% não realizaram acompanhamento pré-natal. Não houve, em 0,772% dos nascimentos alguma informação sobre pré-natal. Conclusão: A incidência de BPN foi semelhante ao observado em países desenvolvidos, fator que é determinado pela qualidade da assistência pré-natal e, conseqüentemente, das ações de promoção e proteção dos grupos em vulnerabilidade, trabalhados na atenção básica, como, neste caso, as gestantes.