

Trabalhos Científicos

Título: Puberdade Precoce Central Secundária À Puberdade Precoce Periférica Devido A Um Tumor De Células De Leydig: Relato De Caso

Autores: Introdução: Os tumores testiculares são uma causa rara de puberdade precoce periférica (PPP), sendo o tumor de células de Leydig (TCL) a principal etiologia. O TCL é considerado benigno na faixa etária pediátrica e desenvolve-se a partir do estroma testicular. A apresentação clínica costuma cursar com desenvolvimento de PPP isossexual, com aumento dos níveis de testosterona independentes de gonadotrofinas. O tratamento consiste em remoção do tumor e em alguns casos pode evoluir para puberdade precoce central (PPC). Objetivos: Paciente do sexo masculino, 7 anos e 8 meses, apresentando crescimento acelerado associado à mudança de comportamento há 8 meses. Ao exame físico, apresentava voz grave, pele oleosa e acne, estadiamento de Tanner G3/P4, testículo esquerdo com volume de 10mL e direito de 3mL e altura entre o percentil 85-97(2 DP acima do alvo familiar). Paciente previamente hígido, sem uso de medicações contínuas. Sem história de uso de creme a base de hormônios pelos familiares, sem história de puberdade precoce na família. Exames iniciais com gonadotrofinas em níveis pré-puberais (LH

Resumo: AMANDA SIMÃO VIGO (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), MEIRE ARIANE SCHAKER (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), DIEGO CALLAI SCHUH (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), JULIANA VAN DE SANDE LEE (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), EDSON CECHINEL (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), GENOIR SIMONI (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), PAULO CÉSAR ALVES DA SILVA (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO)