

## Trabalhos Científicos

**Título:** Agenesia Do Clitóris: Relato De Caso De Uma Malformação Congênita Rara

**Autores:** Introdução: A agenesia do clitóris é uma malformação congênita extremamente rara, caracterizada pela ausência completa do clitóris desde o nascimento, podendo, em alguns casos, estar associada à ausência dos pequenos e grandes lábios. A genitália externa feminina exerce um papel fundamental na reprodução humana e, quando comprometida por alterações estruturais ou funcionais, pode gerar consequências significativas. Tais alterações podem afetar a fertilidade, a continência urinária e a sexualidade da paciente. Devido à sua raridade, essa anomalia é pouco descrita na literatura médica. Objetivos: Relata-se o caso de uma paciente de 1 ano e 10 meses, sem comorbidades, nascida de parto cesáreo, a termo e sem intercorrências, apresentando desenvolvimento antropométrico e neuropsicomotor adequado para a idade. A paciente foi encaminhada ao ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital Agamenon Magalhães para avaliação da genitália externa. Ao exame físico, observou-se ausência dos pequenos lábios vaginais associada à agenesia clitoridiana. A ultrassonografia pélvica mostrou-se compatível com a faixa etária, evidenciando útero em anteversão com volume de  $2,1 \text{ cm}^3$  (dimensões:  $3,6 \times 0,9 \times 1,4 \text{ cm}$ ), ovário direito com  $0,7 \text{ cm}^3$  ( $1,5 \times 0,7 \times 1,2 \text{ cm}$ ), ovário esquerdo com  $0,4 \text{ cm}^3$  ( $1,7 \times 0,5 \times 0,9 \text{ cm}$ ) e endométrio imensurável. Foram solicitados ultrassonografia de rins e vias urinárias, ultrassonografia de abdome total e radiografia para seguimento. Metodologia: Resultados: Conclusão: As anomalias congênitas da genitália externa feminina são raras, com incidência estimada em aproximadamente 1 para cada 20.000 nascimentos. Entre os casos descritos, é mais comum a associação da ausência ou hipoplasia do clitóris com síndromes genéticas ou outras malformações do trato genital. Malformações como hipoplasia ou agenesia do clitóris e dos lábios maiores e menores já foram relatadas em condições como síndrome de Prader-Willi, síndrome de Swyer, síndrome de Robinow, síndrome Charge, além de mulheres com epispádia, meninas com cutis marmorata, telangiectásica congênita, hemangioma perineal extenso, malformações anorrectais, entre outras. A agenesia do clitóris é um distúrbio congênito muito raro que geralmente aparece junto a outras anomalias dos genitais externos. O diagnóstico baseia-se na avaliação clínica e, em alguns casos, em estudos genéticos e endócrinos para descartar síndromes mais complexas.

**Resumo:** ELEN DE OLIVEIRA MUNGUBA (UPE), GISELLE RABELO MACIEL (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE JABOTÃO DOS GUARARAPES), DANIELLE LEAL (UED-HAM), MARIA PAULA BANDEIRA (UED-HAM/IFB)