

Trabalhos Científicos

Título: Subtipo Raro De Carcinoma Papilífero Da Tireoide Na Infância: A Importância Do Diagnóstico Precoce

Autores: Introdução: Nódulos tireoideanos na infância podem ser decorrentes de diferentes causas, sendo uma delas o carcinoma diferenciado da tireoide. A raridade da apresentação dessa entidade na faixa etária pediátrica, principalmente subtipos mais agressivos, enfatizam a importância do diagnóstico assertivo para implementação de terapêutica adequada, visando uma melhor sobrevida. Objetivos: J.X.S., sexo feminino, 7 anos, encaminhada à endocrinologia pediátrica por linfonodomegalia cervical persistente 6 meses após infecção de vias aéreas superiores. Nega dor, rouquidão, disfagia, perda de peso, febre ou outros sintomas. Identificado nódulo em lobo direito da tireoide à palpação, além de linfonodo cervical à direita, 2 cm, endurecido e linfonodo cervical à esquerda, 1 cm, endurecido. Solicitado exames que evidenciaram aumento de tireoglobulina sérica, sem alterações em exames de função tireoidiana e calcitonina. Realizada ultrassom cervical: 2 nódulos tireoidianos de aspecto heterogêneo, contornos irregulares, microcalcificações e vascularização periférica e central (TI-RADS 5), associados a acometimento de múltiplas cadeias linfonodais. Encaminhada para punção aspirativa por agulha fina (PAAF) que confirmou carcinoma papilífero (metastático no linfonodo biopsiado). Dosagem de tireoglobulina em aspirado cervical $> 4.650 \text{ ng/ml}$ (valor de referência)

Resumo: LÍVIA ANDRADE DUARTE (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS), LAURA DRUMMOND NOGUEIRA (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS)