

Trabalhos Científicos

Título: Diagnóstico Diferencial De Lesão Perianal

Autores: FERNANDA FERREIRA CARVALHO (HUGG/UNIRIO), CÁSSIA FREIRE VAZ (HUGG/UNIRIO), MARIANA DE ALMEIDA PINTO BORGES (HUGG/UNIRIO)

Resumo: Segundo a literatura internacional um pouco mais de 25% das mulheres e 6% dos homens sofrerão algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos e infelizmente o agressor normalmente é conhecido da família. Outra patologia que faz parte desse diagnóstico diferencial é a Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal crônica cuja incidência vem aumentando principalmente no ocidente. Na infância e adolescência também vemos o crescimento dos casos, sendo que 25% das doenças inflamatórias intestinais (DII) se manifestam nessa faixa etária. Paciente do sexo masculino, com 12 anos de idade, com desenvolvimento puberal G2 e P2 foi avaliado por 4 serviços de saúde no período de 40 dias devido quadro de dor abdominal e diarreia com sangue. Paciente foi atendido em um Hospital Municipal de Duque de Caxias e devido lesão perianal extensa paciente foi por suspeita de abuso sexual. Devido a evolução do quadro o paciente foi transferido para um Hospital Universitário do Rio de Janeiro onde foi realizado o diagnóstico de Doença de Crohn. A lesão perianal da DC é uma importante comorbidade que afeta as crianças e acometidos, sendo um dos principais fatores que necessitam de abordagem cirúrgica. Como ela pode ser a primeira manifestação da doença, pacientes pediátricos que buscam o serviço de saúde com essa queixa podem chamar a atenção do profissional médico responsável para um possível caso de abuso sexual. Tal situação é grave do pelo aspecto clínico e emocionalmente carregado para família, mesmo que só em caso de suspeita, é um tema difícil de ser abordado junto com a criança e a família. Desse modo, é essencial que, junto do acolhimento da criança em possível situação de risco, como foi feito quando optaram pela hospitalização do menor, sejam pesquisadas outras possíveis causas para a lesão. No caso relatado, os familiares descrevem grande sentimento de vergonha e impotência devido a suspeita de abuso, mesmo quando o quadro clínico já foi esclarecido. No caso do paciente relatado, a queixa de perda ponderal e diarreia nos influenciaram a pensar em outras patologias gastrointestinais que explicam as lesões perianais, sendo realizada a pesquisa para outras possíveis doenças infecciosas e a para DC que se mostrou positiva. Tendo em vista que a lesão perianal é uma complicação frequente da DC, podendo ser um dos sintomas iniciais da doença sem demais alterações clínicas, a suspeita de abuso sexual pode ser um diagnóstico diferencial frequente. Desse modo, é essencial a pesquisa diagnóstica no paciente além da conversa com a família, a fim de evitar situações que podem alterar todo o ambiente familiar e a relação médico-paciente sem perder de vista a proteção do adolescente que pode estar sendo vitimizado.