

Trabalhos Científicos

Título: Dor Abdominal Como Sintoma Guia Para Teratoma Maduro Ovariano Em Adolescente - Relato De Caso

Autores: GABRIEL COELHO DE ALENCAR (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO), SÔNIA MARIA TAVARES DE ALBUQUERQUE GOMES (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO), MANOELA TENÓRIO DE MIRANDA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO), MARIA DE FÁTIMA MARINHO DE SOUZA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO)

Resumo: Teratomas maduros ovarianos (TMO) ou cistos dermóides são tumores das células germinativas do ovário. Apresenta pico de incidência no início da adolescência. Geralmente são assintomáticos em adolescentes e na vigência de sintomas os mais frequentes são dor abdominal, massa em abdome inferior e distensão abdominal. Tais sintomas não diferem dos observados em outras massas ovarianas, não sendo possível diferenciar clinicamente aquelas benignas das malignas. Este estudo tem como objetivo relatar caso de TMO em adolescente sintomática. Descrição do caso: Adolescente de 12 anos, sexo feminino, procura ambulatório de hebiatria com queixa de dor abdominal ocasional há cerca de três meses. Referia náusea e piora da dor associada à alimentação. Telarca aos nove anos, pubarca aos dez. Menarca com 11 anos, menstruação irregular e nega relações sexuais. Ao exame físico: eutrófica e com aumento do volume abdominal, além de som maciço à percussão e discutível massa tumoral à palpação. Exames laboratoriais: hemograma dentro da normalidade, CA-125 de 46,1, CA-19.9 de 1,4 e Antígeno carcinoembrionário de 0,35. USG de abdome total e pelve revelou ovário esquerdo com contornos regulares, medindo 16x13x14cm, com volume de 1524,7cm³. Presença de imagem cística com contornos regulares, contendo septações e líquido espesso, medindo 15x14cm. A adolescente foi admitida em serviço terciário para realização de cirurgia eletiva de laparotomia exploratória. Na ocasião negava cirurgias prévias e o abdome apresentava-se flácido, depressível, indolor, com massa palpável 1cm acima da cicatriz umbilical. Realizado laparotomia exploratória e ooforectomia esquerda. Achados da cirurgia: cisto heterogêneo em ovário esquerdo com aproximadamente 25cm em seu maior eixo, útero de tamanho normal, trompas uterinas e ovário direito sem anormalidades macroscópicas. Retornou ao ambulatório de hebiatria para acompanhamento, com resolução das queixas que motivaram o atendimento inicial. Trata-se de estudo observacional descritivo com dados secundários coletados a partir de prontuário médico e registros fotográficos. Obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - CAAE: 59821522.0.0000.5206. Discussão e comentários finais: Dor abdominal na adolescência usualmente é funcional e não decorrente de doenças orgânicas. Porém, a cronicidade e recorrência dos sintomas, deve servir de alerta para a investigação das causas orgânicas. A história clínica e exame físico bem feito são indispensáveis para diagnóstico adequado. Teratoma ovariano representa a maioria das neoplasias do ovário em mulheres abaixo de 20 anos. Os sintomas da doença em fase inicial são mínimos, inespecíficos ou inexistentes. USG é o exame inicial para avaliação e determinação de sítio e a laparotomia é o tratamento de escolha em grandes massas, como neste caso. Portanto, este estudo serve de alertar para a importância da valorização e investigação da queixa clínica de dor abdominal crônica na adolescência.