

Trabalhos Científicos

- Título:** Hipertensão Intracraniana Idiopática Um Diagnóstico Diferencial De Cefaleia Na Adolescência
- Autores:** CARLA CECÍLIA DA COSTA ALMEIDA (HGF), ANA CLARA GADELHA FERNANDES (HGF), HAYSSA FALCÃO DE OLIVEIRA (HGF), RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA (HGF), GISELE TAHIM OTON SIDOU BRASIL (HGF), MARIA NICÓ DUARTE CAMELO (HGF)
- Resumo:** Introdução: A Hipertensão Intracraniana Idiopática (HII) é uma doença que causa elevação da pressão intracraniana e pode levar a quadros de cefaleia com sinais de alarme. Um dos principais fatores de risco para HII é a obesidade. Descrição e análise de caso: Descrever um caso de HII em adolescente do sexo feminino, obesa, com 15 anos de idade, atendida em Enfermaria de Pediatria de hospital terciário da rede pública de saúde de Fortaleza - Ceará. A paciente teve o diagnóstico de HII e foi tratada com acetazolamida, topiramato e punção líquórica de alívio. Resultados: A HII é uma importante causa de cefaleia com sinais de alarme e também apresenta considerável relação com a obesidade, que apesar de ser um fator de risco modificável para HII, tem sido um problema cada vez mais prevalente na faixa etária pediátrica.