

Trabalhos Científicos

Título: Úlcera De Lipschutz Em Paciente Pediátrico Após Infecção Pelo Vírus Epstein-Barr

Autores: MATHEUS FREIRE DE LIMA (PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANÇA), RENATA NOVELLINO DO ROSÁRIO AZZI (PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANÇA), GUSTAVO DUQUE YECKER (PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANÇA), TAYNÁ BASTOS MOURÃO VIANA (PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANÇA), MARIA IZABEL MÜLLER DE CAMPOS DUTRA E SILVA DE ANDRADE (PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANÇA), ANDRÉ RICARDO ARAUJO DA SILVA (PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANÇA)

Resumo: A úlcera de Lipschutz é uma condição rara, não sexualmente transmissível, caracterizada pelo aparecimento de ulcerações largas, profundas, de base necrótica cobertas por exsudato acinzentado e muito dolorosas na região vulvar. Pode ser precedida por sintomas influenza-like ou mononucleose-like. A úlcera genital aguda tem sido relacionada a infecções pelo vírus Epstein-Barr, além de outros agentes virais e bacterianos menos comuns. É apresentado caso de úlcera de Lipschutz em paciente adolescente do sexo feminino, de 11 anos de idade. A paciente é internada em enfermaria acometida de lesão ulcerada única em face interna de pequeno lábio direito, doloroso e com saída de secreção fétida amarelo esverdeado. Nega febre ou demais sintomas. Com o proceder da investigação diagnóstica através da realização de exames complementares, foram excluídas possíveis causas infecciosas. Devido as características clínicas da lesão, da evolução favorável da paciente e da sorologia positiva para Epstein-Barr, se confirmou o diagnóstico de úlcera de Lipschutz. As úlceras genitais são de difícil diagnóstico, principalmente na faixa etária pediátrica, em que a maioria delas não são provenientes de infecções sexualmente transmissíveis. A úlcera de Lipschutz é tipicamente extensa, dolorosa, profunda, podendo ou não estar associados a outros sintomas sistêmicos. O diagnóstico é de exclusão, tendo como principal diagnóstico diferencial as infecções sexualmente transmissíveis. O tratamento inclui corticoides, medidas gerais de suporte e medicamentos sintomáticos até a cicatrização total das lesões.