



Trabalhos Científicos

Título: Causa Incomum De Intussuscepção Intestinal Em Criança

Autores: VANESSA PACINI INABA FERNANDES; ELIZETE A LOMAZI; RITA CARVALHO; MARIA ANGELA BELLOMO-BRANDÃO

Resumo: Introdução: Intussuscepção intestinal é a causa mais comum de obstrução intestinal na idade pediátrica, e precisa de intervenção imediata, seja cirúrgico ou não cirúrgico. Este relato de caso descreve a presença de intussuscepção em uma criança com uma história crônica de diarreia, uma apresentação incomum em crianças, o que deve indicar a possibilidade de diagnóstico diferencial. Descrição do caso: Apresentamos um caso de um menino de três anos de idade, com diarreia aquosa, distensão abdominal, vômitos e perda de peso ao longo de dois meses e com a imagem de ultra-som de intussuscepção. O paciente foi submetido a cirurgia e intussuscepção tinha resolvido espontaneamente. Em uma investigação mais aprofundada da má absorção, paciente foi submetida a endoscopia digestiva alta, sugestivos de doença celíaca. Após uma dieta sem glúten específico foi introduzido, o paciente apresentou recuperação total de peso e crescimento normal. Discussão: Intussuscepção idiopática é uma causa comum de obstrução do intestino delgado em crianças entre as idades de 3 meses a 5 anos e foi recentemente associada à doença celíaca subjacente. Neste caso, juntamente com relatos anteriores, sugerem que a intussuscepção em pacientes com doença celíaca pode ser rotineiramente subdiagnosticada. Deve-se atentar para a apresentação crônica e assintomática da doença celíaca, que geralmente não requer intervenção cirúrgica urgente. Esta constatação deve levar o clínico a considerar a doença celíaca como uma possível etiologia subjacente em crianças com história recente de intussuscepção idiopática