16º Congresso Brasileiro de GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
28 de junho a 01 de julho - 2016
Vitória - ES

Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Da Profilaxia Secundária Endoscópica Em Crianças E Adolescentes Com Varizes De Esôfago

Autores: JÚLIO ROCHA PIMENTA; ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA; JOSÉ RICARDO BORÉM LOPES; NATHALIA LUZIAS DE MATOS E SILVA; ALICE MENDES MOURA; SIMONE DINIZ CARVALHO; PAULO FERNANDO SOUTO BITTENCOURT; THAÍS COSTA NASCENTES QUEIROZ; ELEONORA DRUVE TAVARES FAGUNDES; ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Resumo: Objetivo: Avaliar a eficácia da profilaxia secundária endoscópica na prevenção de hemorragia digestiva alta em de crianças e adolescentes com varizes esofageanas (VE's). Métodos: trata-se de uma coorte, com 85 pacientes menores de 18 anos, cirróticos e não cirróticos, com diagnóstico de hipertensão porta, submetidos à profilaxia secundária endoscópica com ligadura elástica ou escleroterapia. Foram avaliados: erradicação das varizes, incidência de ressangramento, número de sessões endoscópicas para erradicação, incidência de surgimento de varizes de fundo gástrico e gastropatia da hipertensão porta. Resultados: a ligadura elástica foi realizada em 34 pacientes (40%) e a escleroterapia em 51 pacientes (60%). As VE's foram erradicadas em 81,2%, após mediana de quatro sessões endoscópicas. As varizes recidivaram em 38 pacientes (55,1%). Trinta e seis pacientes (42,3%%) ressangraram, sendo mais prevalente no grupo onde foi realizado escleroterapia. Varizes gástricas e gastropatia da HP se desenvolveram em 38,7% e 57,9% dos pacientes, respectivamente. Pacientes submetidos à ligadura elástica apresentaram menor taxa de ressangramento (26,5% x 52,9%) e menor número de sessões para erradicação das VE's (3,5 X 5). Conclusões: a profilaxia secundária se mostrou eficaz na erradicação das VE's, e controle de novos episódios de HDA devido à ruptura de varizes esofageanas. A ligadura elástica apresentou menores taxas de ressangramento e menor número de sessões para erradicação das varizes em relação à escleroterapia.