



## Trabalhos Científicos

**Título:** Trombose De Veia Porta Como Causa De Hipertensão Portal Em Criança Com Hemorragia Digestiva Alta

**Autores:** ARACELI RIBEIRO CAMPOS; TATYANA BORGES DA CUNHA; GREYCE MARA RODRIGUES MEDEIROS; GEISA NEUZA DE MIRANDA; MARISA RODRIGUES DE FARIA; ADRIANA ZANIN BARBOSA

**Resumo:** Introdução: A trombose de veia porta (TVPo) é uma das causas mais comuns de hipertensão portal (HP) na infância e sua manifestação inicial pode ser a hemorragia digestiva decorrente do rompimento de varizes esofagogástricas. Descrição do caso: T.R.F., 11 meses, sexo masculino, com quadro de vômitos com sangue, dando entrada em serviço de urgência na cidade de origem, instável hemodinamicamente, necessitando de transfusão sanguínea. Nesta internação, realizou endoscopia que evidenciou varizes esofágicas incipientes, único cordão varicoso de fino calibre, não sendo necessária realização de procedimento terapêutico. Tem antecedente de alergia a proteína do leite de vaca, com diagnóstico aos 2 meses, apresentando diarreia com sangue e urticária, com melhora após dieta de exclusão. Após 1 mês apresentou novo episódio com hematêmese volumosa, melena e febre, sendo encaminhado para Hospital Terciário. Na endoscopia, foram observados dois cordões varicosos de pequeno e médio calibre, com áreas de fragilidade vascular, nos quais foi aplicada solução esclerosante. Na ultrassonografia, foi observada transformação cavernomatosa na veia porta, não sendo identificado fluxo na veia esplênica. Com o diagnóstico de trombose de veia porta, recebeu alta com controle do sangramento, para acompanhamento ambulatorial. Discussão: A obstrução extra-hepática da veia porta é causa importante de HP, sendo que a TVPo é identificada em 40% das crianças com hemorragia digestiva decorrente de varizes esofagogástricas. A esplenomegalia pode fazer parte também da apresentação inicial, levando ao hiperesplenismo secundário. O diagnóstico é realizado através da ultrassonografia abdominal com doppler. O tratamento é direcionado a complicações, incluindo o manejo adequada da hemorragia digestiva e derivação porto-sistêmica, em casos selecionados. Conclusão: A trombose de veia porta é uma das causas mais importantes de hemorragia digestiva em crianças, com impacto importante na qualidade de vida dos pacientes. Desta forma, uma abordagem diagnóstica e terapêutica adequada é importante na redução da morbimortalidade.